

72. *Rhamnus alpinus* : *Willd.* i. p. 1097. (W.)
 73. *Ribes rubrum* : *Willd.* i. p. 1153. (W.)
 74. *R. glandulosum* : *Willd.* i. p. 1154. *R. prostratum* : *Pursh.* i. p. 168. (W.)
 75. *R. nigrum* : *Willd.* i. p. 1156. (W.)
 76. *R. floridum* : *Willd.* i. p. 1158. *Pursh.* i. p. 164. (W.)
 77. *R. oxyanthoides* : *Willd.* i. p. 1159. *Pursh.* i. p. 165. (W.)
 78. *Viola pinnata* : *Willd.* i. p. 1160. (C.)
 79. *V. blanda* : *Pursh.* i. p. 72. (W.)
 80. *V. debilis* : *Nuttall. Gen. Amer.* i. p. 150. (W.)
 81. *V. canina* : var. ? *Willd.* i. p. 1164. (W.)
 82. *V. Canadensis* : *Willd.* i. p. 1166. *Pursh.* i. p. 174. (C.)
 83. *Comandra umbellata* : *Nuttall. Am.* i. p. 157. *Thesium umbellatum* :
Pursh. i. p. 177.
Comandra a *Santalum* differt calyce persistente monentè doctiss. Brown, qui primus genus distinctum esse.
 Prodri. pl. Novæ Hollandie, i. p. 353. indicavit. (W.)

84. C. : *livida sarmentosa*, foliis ellipticis flaccidis, umbellà axillari solitarià
 pedunculatà sub-triflorà. (W.)

Sarmentum inter muscos repens radicem refert et caules alternatim edit. *Caules* spithamei simplices suf-
 fruticosi, erecti, inferne teretes, superne obsolete triquetri. *Folia* elliptica, venosa, obtusa, nervo excurrenti
 apiculata, flavo-viridescentia, concolora, subcassilia. Umbellà in medio caulis axillaris, bi-vel triflora,
 pedicellis brevissimis. *Pedicelli* rarissime foliolo involucrati sunt. *Flores* parvi, inconspicui. *Calyx* cam-
 panulatus, lacinias quinque acutis, viridibus, intus apicem versus fuscis. *Squame* virido-fuscae. *Stylus*
 crassus. *Germen* nux globosa, calyce coronata.

Variat foliis rugosis flavo maculatis reticulatis.

Hab. In shady mossy woods. Not seen to the northward of Great Slave Lake.

85. *Apocynum androsæmifolium* : *Willd.* i. p. 1259. *Pursh.* i. p. 79. (W.)
 86. *Gentiana amarella* : *Willd.* i. p. 1347. (W.)
 87. *G. crinita* : *Willd.* i. p. 1352. *Pursh.* i. p. 185. (W.)
 88. *G. propinqua* : corollà 5-fida tubuloso-campanulata ; apicibus limbi subserratis ;
 fauce nuda, foliis radicalibus linear-i-ovobatis ; caulinis lanceolatis. (H.)
Facies omnino *G. pratensis* sed fauce nuda.

89. *G. rotata* : *Gmel. Flor. Sib.* iv. p. 112. No. 78, t. 53, f. 1. (H.)

Cum figurâ Gmelini planta nostra quadrat, forsitan tamen a *Swertia rotata*, L., species distincta propter
 lacinias calycis angustas corollâ longiores.

90. *Heuchera Richardsonii* : calycis limbo inæquali obliquo. *Brown, ad finem*
catalogi. (W.)

91. *Cicuta virosa* : *Willd.* i. p. 1445. (W.)

92. *C. maculata* : *Willd.* i. p. 1446. *Pursh.* i. p. 195. (W.)

93. *Smyrnium trifoliatum* : *Nuttall. Am.* i. p. 195. (S.)

94. *Viburnum Oxyccoccus* : *Pursh.* i. p. 203. (W.)

Named, by the Crees, Mongsoa-Meena, or Moose Berry.