

C'est vers l'âge de dix mois que les chevaux qui ne doivent pas servir à la reproduction doivent subir la castration. Cette opération doit être faite par un vétérinaire.

Soins à donner aux Vaches.

Peut-être n'est-il pas inutile de donner ici quelques conseils au point de vue des soins à donner à l'étable.

Dans certaines contrées on ne se donne aucune peine pour nourrir convenablement la vache et entretenir sa santé pendant l'hivernage, sous prétexte qu'elle ne produit rien à cette époque de l'année, voilà un bien mauvais calcul et une grave erreur.

Que l'on soit bien convaincu au contraire que pour tirer un bénéfice important de la laiterie il faut que les vaches soient toujours en parfaite santé, bien nourries conséquemment, et tenues en bon état.

Si elles souffrent l'hiver à l'époque justement où elles portent leur veau, il est impossible qu'elles donnent, d'une part de beaux rejets et que d'un autre côté, elles produisent beaucoup de lait même lorsqu'elles reviendraient en bon état pendant l'été.

Il est certain en effet et l'expérience le prouve, que si une vache est maigre pendant l'hiver, quels que soient les soins qu'on lui donne ensuite et quelle que soit la nourriture qu'on lui donne au printemps, elle ne pourra fournir pendant la saison, une quantité comparable à celle qu'elle aurait donnée si l'on eut eu soin de la maintenir en bon état durant l'hiver.

Il est utile de fournir constamment aux vaches non seulement une nourriture abondante, saine et profitable mais aussi de les tenir chaudement, sèchement et proprement. Tout cela est facile en renouvelant leur litière après avoir enlevé le fumier, en les lavant et les brossant convenablement, ce qui ne sera pas de trop.

L'Élevage des Volailles.

L'élevage des animaux de basse cours présente pour le cultivateur un intérêt considérable. Il fournit sans grands frais un revenu assez important qui pourrait être surpassé.

Le poulailler, c'est le nom qu'on donne au local où sont logées les volailles, doit avoir des dimensions en rapport avec le nombre d'individus qu'il est destiné à contenir. Il doit être spacieux, bien aéré, sans toutefois que les volailles soient exposées aux courants d'air toujours à craindre pour eux. Le sol en sera cimenté et les parois verticales tenues aussi lisses que possible pour en rendre le nettoyage plus facile.

Le mobilier consistera en juchoirs sur lesquels les volailles se reposeront pendant la nuit et en pondoirs où les poules viendront déposer leurs oeufs.

La question des juchoirs présente une assez grande importance. D'habitude ils sont formés d'une sorte d'échelle à barreaux arrondis de faible diamètre et superposés à une certaine distance les uns au-dessus des autres. Une simple réflexion permet de juger combien cette disposition est contraire aux lois naturelles.

La poule n'est pas un oiseau percheur, elle aime à se reposer à une certaine hauteur au-dessus du sol, mais sur une surface un peu étendue. La mauvaise disposition des juchoirs est une des causes pour lesquelles les volailles abandonnent le poulailler et vont se percher sur les tas de fagots, ou les voitures etc., d'où il est difficile de les déloger.

D'autre part l'instinct de la domination leur font rechercher les places les plus élevées, les barreaux les plus haut placés, d'où les combats des luttes très préjudiciables au repos.

Les juchoirs devront être placés à 16 pouces seulement au-dessus du sol et seront disposés sur un plan unique. Ils seront formés de barres de bois ayant une largeur de 4 pouces et distantes les unes des autres de 19 pouces.

Les pondoirs sont des caisses en bois d'une profondeur suffisante pour que la poule y soit à son aise ils seront fixés le long des murs à une hauteur d'un mètre, une petite échelle en permettra l'accès. Il est d'usage de laisser dans chaque nid un oeuf en plâtre ou en porcelaine pour y attirer les pondeuses.

Le poulailler doit être tenu dans un état de propreté constant.

Indépendamment du nettoyage complet et indispensable chaque semaine on devra procéder à l'enlèvement des déjections qui s'accumulent sur le sol.

Cet engrais poulaine possède une valeur fertilisante qu'on peut évaluer à cinq fois celle du fumier de cheval, comme il est de consistance humide on rendra son enlèvement plus facile en recouvrant le sol sous les perchoirs, d'une couche de matière absorbante, soit des cendres, de la sciure de bois etc. Cet engrais sera réservé pour la fertilisation du jardin mais il devra être employé avec réserve, étant donnée sa richesse en principes actifs.

On obtiendra des oeufs l'hiver qu'à la condition expresse d'avoir des pondeuses c'est-à-dire des poules du dernier printemps, nées de mars à mai. Si donc ces poules sont logées chaudement, si elles picorent dans les étables, dans les bergeries ou sur les fumiers une partie de la journée, trouvant toujours quand elles le désirent un abri contre les intempéries de la saison on

1911 JUILLET 1911						
DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

TEMPERATURE. — JUILLET 1911.

Du 1er au 4, température élevée.

Du 5 au 8, orageux.

Du 9 au 12, frais et venteux.

Du 13 au 16, grande activité électrique.

Premier Quartier le 3.

Pleine Lune le 11.

Du 17 au 21, brouillards épais.

Du 22 au 26, orageux.

Du 27 au 31, chaud.

Dernier Quartier le 19.

Nouvelle Lune le 25.