

du rein.—Pendant les huit jours suivants, administrer chaque jour deux cuillerées à café de la solution suivante :

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Iodure de potassium ..... | 3 grammes. |
| Eau distillée.....        | 100 —      |

Alterner ainsi pendant longtemps l'usage des alcalins et des solutions iodurées.

*Mouvement Thér.*

### **Salol dans la cystite aigue et chronique**

Le docteur B. Arnold attire de nouveau l'attention sur les résultats excellents que donne le salol à la dose moyenne de 2 grammes toutes les trois heures, dans le traitement des cystites aiguës et chroniques. Il résume comme suit l'action du salol dans ces cas (il s'appuie sur des observations personnelles et sur celles d'autres auteurs) :

- 1o Le salol rend acide l'urine alcaline ;
- 2o Il fait disparaître la fétidité de l'urine ;
- 3o De trouble qu'elle était l'urine devient limpide, le dépôt muco-purulent diminue continuellement, devient plus léger et plus floconneux et dans la plupart des cas disparaît complètement ;
- 4o Ordinairement on constate l'augmentation de la diurèse ;
- 5o Propriété très importante : le salol est bien toléré par l'estomac, même pris pendant un temps prolongé. Ce fait est peut être attribuable à ce que le salol traverse l'estomac tel quel et ne se décompose que dans l'intestin (phénol et acide salicylique) ;
- 6o Dans le cas où, pour le lavage de la vessie, on ne peut se servir que des solutions très faibles, le salol pris à l'intérieur contribuera pour sa part à la désinfection de celle-là.

Il va sans dire qu'en même temps on ne négligera pas les règles générales pour le traitement des cystites.—*Le Courrier Médical.*

### **La résorcine dans le traitement des ulcérations tuberculeuses du larynx**

D'après les observations de M. le docteur Von Bymovsky (de Schinznach) la résorcine serait un excellent moyen de traitement des ulcérations tuberculeuses du larynx, tout aussi efficace que l'acide lactique et présentant sur celui-ci l'avantage d'être indolore.

Voici quelle doit être, d'après ce confrère, la conduite à tenir en présence d'une laryngite tuberculeuse.

Tout au début, lorsque les infiltrations et les ulcérations du larynx se trouvent encore à la période aiguë ou inflammatoire, on fera bien de se borner aux dérivatifs externes, aux badigeonnages avec une solution