

Doigt postérieur plus ou moins lié aux antérieurs par une membrane ;

Face et gorge nues. Gorge munie d'une poche. II. PÉLÉCANIDES.

Tête sans espace nu. Gorge sans poche ;

Ouvertures nasales tubuleuses. III. PROCELLARIIDES.

Ouvertures nasales linéaires, non tubuleuses. IV. LARIDES.

Doigt postérieur libre ou manquant ;

Doigt postérieur distinct, avec un large lobe pendant V. COLYMBIDES.

Doigt postérieur o et ongles comprimés VI. ALCIDES.

1. Fam. des Anatides. *Anatidæ*.

Les 2 mâchoires dentées, la supérieure se terminant par un ongle obtus, arrondi. Plumes du front se prolongeant en avant sur le sommet du bec, celles des côtés et sous la mâchoire inférieure s'étendant dans la même direction. Commissure droite. Jambes courtes.

Cette famille se compose d'oiseaux généralement répandus dans toutes les parties du globe, tant dans l'ancien que dans le nouveau continent. Tous se distinguent par l'abondance de leur duvet, et la plupart fournissent d'excellents mets de table.

Cette grande famille se subdivise en 6 sous-familles qu'on peut séparer les unes des autres par les caractères suivants :

Un seul rang de dents à la mâchoire supérieure ;

Jambes couvertes d'écailles hexagonales en avant ;

Cou très long. Tarse plus court que le doigt

médian.....CYGNINES.

Cou long. Tarse plus long que le doigt médian...ANSÉRINES.

Jambes couvertes de plaques transverses en avant ;

Doigt postérieur à lobe membraneux très étroit.ANATINES.

Doigt postérieur à lobe membraneux très large ;

Extrémité du bec relevée et recourbée.

Queue molleFULIGULINES.

Extrémité du bec brusquement rabattue.

Queue raide.....ERIMATURINES.

Deux rangs de dents à la mâchoire supérieure, séparés par une rainure dans laquelle vient se loger la mâchoire inférieure.....MERGINES.