

La constante uréique, chez notre malade, égale 0.115. La normale est 0.06. Or, si l'on tient compte que dans les néphrites avancées, dans les insuffisances marquées, le chiffre de cette constante peut aller jusqu'à l'unité (1.), il est permis de croire, que, chez notre malade la lésion rénale, appréciée de par son fonctionnement, n'est que *parallèle* à la phlegmasie viscérale généralisée de l'érythrémie, et rien de plus.

D'autre part, le *rapport azoturique*, que je demande toujours, en même temps que la constante d'Ambard, pour des raisons que je publierai ultérieurement avec Baril, devant cette société, s'est montré égale à 0.77. La normale est 0.80. Les substances albuminoïdes sont donc ici transformées en urée par le foie dans une proportion très voisine de la normale; et la valeur fonctionnelle de cet organe, sans être parfaite, éloigne de nous l'idée que le danger, pour notre malade, est à son foie.

Ces constatations sont importantes parce qu'elles nous permettent d'établir, dans le cas particulier, *comme traitement*, un régime rationnel d'autant plus substantiel que les voies d'élimination sont moins insuffisantes; un régime dans lequel il sera tenu compte surtout de l'*athérome* et de l'*artério-sclérose* du malade: c'est-à-dire, des repas, dont seront écartés les aliments riches en *cholestérine*: oeufs, fait, riz de veau, cervelles; et où seront permis les viandes adultes et bien cuites, les pâtes alimentaires, certains légumes et fruits.

Enfin, contre l'*érythrémie* proprement dite, *comme traitement causal*, nous basant sur la lésion anatomique qui est à l'origine de ce syndrome i.e.: "la transformation rouge de la moëlle des os longs (état fœtal), hyperplasie diffuse intéressant surtout les éléments rouges", nous nous proposons d'employer, chez ce malade: l'*opothérapie médullaire* (action régulatrice).

Le *citrate de soude*, préconisé récemment par Chauffard (Soc. Méd. des Hop. Paris 1913), à la dose de 7 grammes par jour, et qui nous paraît dirigé, dans cette maladie, surtout contre la *viscosité* et la *coagulabilité* du sang, sera aussi prescrit en même temps que l'*opothérapie*; et les résultats de cette thérapeutique seront contrôlés par la *fréquente numération* des globules rouges et la *viscosimétrie* du sang.