

Parmi les conséquences pratiques, qui découlent de ce fait, l'auteur insiste sur la nécessité de surveiller la vessie dans les cas d'accouchement difficile, toutes les fois que l'on a donné de l'ergot de seigle. Souvent, en effet, cet organe est distendu, au point de gêner l'accouchement, et l'on a vu dans ces circonstances le travail, jusqu'alors lent et difficile, s'accélérer et se terminer heureusement, sous la seule influence du cathétérisme. (*The Lancet*, 2 août 1873.)—*Lyon Médical*.

L'UNION MÉDICALE DU CANADA.

MONTREAL, 1er NOVEMBRE 1873.

Avis aux abonnés.

Nous avons envoyé, dans le dernier numéro, une petite note à nos abonnés, les priant de vouloir bien nous faire parvenir au plus tôt le prix de leur abonnement. Nous sommes heureux de voir qu'un grand nombre ont répondu avec empressement à un appel si raisonnable. Nous espérons que tous se feront un devoir de payer leur contribution avant que l'année soit expirée.

Un certain nombre de nos abonnés, surtout de la ville de Québec, nous ont informé qu'ils s'étaient déjà acquittés envers le journal. Nos agents ne nous ayant pas encore rendu un compte complet, le prix de l'abonnement dans certains cas a été réclamé par erreur. Nous prions ces messieurs de nous excuser et nous les assurons que nous avons pris des mesures pour que ce désagrément ne se renouvelle plus.