

PÆDIATRIE.

Nouveaux remèdes contre la coqueluche.*(Deut. med. Wochenschr. 1er janv. 1891.)*

Von Genser fut le premier qui prescrivit l'usage de l'antipyrine dans le traitement de la coqueluche. Ses essais se portèrent sur 120 cas : la maladie ne durait plus en moyenne que 24 jours au lieu de 60 à 90 jours, en administrant aux enfants un peu âgés 1 décigramme. Sonnenberger fit aussi les mêmes essais sur 70 cas. Aux enfants jeunes, il donnait 0,03 à 0,1 d'antipyrine quatre fois par jour; aux enfants plus âgés de 0,15 à 1 gramme. Il a observé un soulagement considérable et une forte diminution de la durée de la maladie. Toutefois l'usage de l'antipyrine n'est pas toujours absolument inoffensif, et il arrive souvent des cas d'empoisonnement par cette substance. Rothe, qui a observé des résultats défavorables dans l'emploi de l'antipyrine, se sert d'une combinaison de teinture d'iode et d'acide carbolique, et il vante le grand effet de cette médication dans le traitement de la coqueluche. Sur une centaine de cas observés par lui, et où il ne pouvait y avoir erreur, la maladie traitée par ce système n'a jamais duré plus de quatre semaines. Il se sert de la solution suivante :

Acide carbolique.....	0 10	centig.
Esprit de vin rectifié.....	0 10	"
Teinture d'iode.....	X	gouttes.
Teinture de belladone.....	XXX	"
Eau de menthe.....	50	gram.
Sirop opiacé.....	1	"

à donner aux enfants de 2 ans, une cuillerée à café toutes les deux heures.

L'antifébrine est employée avec avantage comme sédatif des nerfs et comme antispasmodique dans la coqueluche. Le Dr Love (St Louis) a publié 50 cas traités de cette manière avec les résultats les plus satisfaisants. Kate C. Haw a employé avec succès l'acétanilide. La dose administrée quatre fois par jour à des enfants un peu âgés variait de 0,03 à 0,30 centig.

R. Heiman recommande aussi la phénacétine dans la coqueluche. Il mentionne un cas traité avec de bons résultats par la phénacétine, là où l'antipyrine n'avait produit aucun effet. La dose qu'il a fait administrer à un enfant de 3 ans a été de 0,10 centig. quatre fois par jour.