

demie avec une constipation résistant à tous les traitements et ne cédant qu'à grand'peine, tous les huit ou dix jours, à de grands lavements répétés.

A bout de moyens, il conseilla l'opération, expliquant à la famille qu'il y avait peut-être une bride empêchant le cours des matières et que l'opération guérirait en ce cas. S'il n'y avait rien, l'opération ne ferait pas de mal, étant elle-même assez dépourvue de dangers.

L'opération fut acceptée et pratiquée. Le ventre ouvert on ne trouva rien, ni adhérences à d'autres organes, ni brides, ni appendicite, enfin rien du tout. Le ventre refermé, la malade guérit de l'opération et de sa constipation qui n'est plus reparue depuis lors, la malade allant à la selle régulièrement tous les jours. Cette malade a été opérée le 1er septembre.

Le docteur LESAGE se demande si l'infection intestinale n'aurait pas été produite ici par un mécanisme analogue à celui qui infecte le foie au cours de l'appendicite, c'est-à-dire par voies des lymphatiques, absorbant le pus au niveau de l'appendice pour le transporter sur les parois du gros intestin.

Le docteur DE COTRET se souvient d'avoir traité un cas ressemblant fort à celui rapporté par le docteur Hervieux. La maladie avait débuté par le cœcum et avait gagné l'appendice pour former ensuite cercle vicieux. La malade a guéri après de longs mois par le traitement médical et le régime.

Il croit que dans le cas présent la maladie avait également débuté par l'intestin. En enlevant l'appendice, on a commencé la guérison que le régime a complétée. Il ne croit pas qu'on puisse invoquer l'intervention des lymphatiques, l'infection s'étant produite de proche en proche, par continuité de tissu.

M. le docteur HERVIEUX reprend alors les différentes opinions émises.

Il élimine d'abord l'idée émise par le docteur Lesage. On aurait dans ce cas trouvé des traces de lymphangite et il n'y en avait aucune.

Le docteur Guérin dit que les symptômes du début n'ont pas été ceux de l'appendice, tels que, du moins, on les rencontre en général. Il en conclut que la maladie a dû commencer dans l'intestin.

Eh bien il ne faut pas se hâter de conclure à l'absence d'appendicite par l'absence de symptômes rapportés par la malade,