

MONTREAL-MEDICAL

VOL. V

15 MAI 1905

No 3

CONSIDERATIONS CLINIQUES SUR TROIS HÉMIPLÉGIQUES. (1)

PAR M. LE PROFESSEUR GUÉRIN.

Voici trois malades qui présentent le même symptôme d'hémiplégie du côté gauche et qui sont cependant affectés de trois lésions différentes. Les processus anatomo-pathologiques que l'on rencontre dans ces cas sont causés soit par une méningite, une encéphalite, une tumeur, un abcès, un kyste hydatique, un état urémique ou hystérique, mais le plus souvent c'est le résultat d'une hémorragie cérébrale ou d'un foyer de ramollissement embolique. Chez ce malade âgé de 53 ans, vous ne trouverez aucune de ces causes; hémiplégique depuis dix jours, ce n'est que graduellement et après beaucoup de douleurs accompagnées de fièvres que les jambes furent atteintes de parésie et plus particulièrement la jambe gauche, la droite, atteinte la première, est maintenant en convalescence, mais le bras et la face du même côté sont pris à leur tour. Ce patient, télégraphiste de profession et alcoolique d'habitude, écrivait de la main droite et envoyait des dépêches de la main gauche, il s'est ainsi surmené depuis plusieurs années; pour stimuler son activité, il prenait en moyenne douze verres de gin par jour, quelquefois plus et fumait beaucoup. C'est aussi un ancien tuberculeux, qui a réussi à scléroser de nombreux foyers de son poumon gauche.

Il a souffert à l'âge de sept ans d'une pleurésie tuberculeuse qui a laissé sa signature. Père de quatre enfants en bonne santé, il n'a jamais eu la syphilis et l'on ne trouve aucune lésion cardiaque ou vasculaire; l'on peut facilement éliminer toutes les

(1) Observations recueillies par MM. de Bellefeuille et