

du renflement lombaire a envahi le cône terminal (insensibilité de la vessie et du rectum au passage des urines et des matières). Cette complication médullaire tient essentiellement à la tuberculose du sujet. Les myélites tuberculeuses, ainsi que le Professeur Raymond l'avait établi dès 1886, renferment deux types principaux : la myélite avec tubercules nodulaires, celle-ci limitée, et la myélite aiguë diffuse, cette dernière liée à l'action des toxines tuberculeuses. Il y a, une dizaine d'années, on attribuait ces myélites diffuses, qui font suite à une polynévrite, à une névrite ascendante, et l'on citait comme exemple de cette propagation, l'évolution de la rage. Mais le germe de la rage remonte vers la moelle le long du cylindre-axe, et dans l'espèce il n'y a aucun signe de névrite concomitante. Du reste, la moelle est défendue du côté des nerfs par des organes de défense : espace sous-arachnoïdien, ganglion rachidien. Une lésion d'un nerf ne retentit que très difficilement sur la moelle. Lorsque l'infection suit la voie arachnoïdienne, le tableau clinique est différent. On observe une pachyméningite, une méningo myélite avec exagération des réflexes tendineux, tous symptômes qui ont manqué dans le cas présent. Ce sont les infections sanguines qui donnent lieu à des myélites diffuses ; l'infection tuberculeuse a produit successivement la polynévrite et la myélite, sans que la première puisse être considérée comme cause de la seconde.

En dépit de la gravité du pronostic, de tels malades doivent être soignés. Il faut remonter l'état général par des injections sous-cutanées de cacodylate de soude, de sulfate de strychnine, une bonne alimentation, le séjour au grand air. Sous de pareilles conditions, les toxines tuberculeuses cessent de se déverser dans le torrent sanguin et des malades, bien qu'atteints d'eschares profondes peuvent guérir au bout de quinze mois, dix-huit mois, deux ans. Il est peu probable que le sujet actuel se remette. Les conditions hygiéniques de l'hôpital ne sont point celles qu'il faut pour rétablir des malades de cette gravité.