

hyalines, à nervures brunes. Pattes rousses, tarsez antérieurs frangés de longs poils roux et raides, les hanches ; les 4 cuisses antérieures, avec l'extrémité des tarsez, noir ou brun foncé ; les cuisses intermédiaires plus ou moins rousses en dessous. Abdomen conique, roux sans aucune tache, les 3 segments basilaires avec une ceinture apicale plus au moins argentée ; le terminal triangulaire, caréné sur ses côtés ; tarière distincte, rousses.—Los Angeles (Coquillett).

Belle espèce bien distincte par sa coloration. (*)

Liris magnifique. *Liris magnifica*, n. sp.

♂—Long. .55 pce. Noire tachée de jaune ; toute la face, l'extrémité des mandibules exceptée, la base des antennes en dessous, le scape entièrement, une grande tache en croissant sur le vertex, les joues, le prothorax, les écailles alaires avec 2 taches au-dessous, une grande tache sur les flancs, quatre lignes sur le dos du mésothorax, les 2 intérieures s'approchant de l'écusson, une tache sur l'écusson disjointe au milieu, une petite ligne oblique de chaque côté en avant, le post-écusson avec une ligne sur les angles du métathorax et une grande tache sur les côtés à la base, jaune. Ailes enfumées-roussâtres. Pattes jaunes avec les trochantins, le dessus des hanches et la base des cuisses, noir. Abdomen fortement ponctué excepté à l'extrémité, les sutures noires et fortement enfoncées, celle à la suite du 1er segment plus fortement que les autres, la base de celui-ci noir, tout le reste jaune.—Los Angeles (Coquillett). (*)

Liris rugueuse. *Liris rugosa*, n. sp.

♂—Long. .50 pce. Noire, tachée de jaune, ponctuée-rugueuse très densément sur le vertex et le thorax, moins pressées sur l'abdomen, la face entièrement, la base des antennes, une tache en arrière des yeux, le prothorax, les écailles alaires, les tubercules avec une tache en arrière, le post-écusson, jaune citron ; les mandibules noires portant à leur base une touffe de poils roussâtres. La base du métathorax avec poils blancs.

(*) Type au Musée du Parlement, Québec.