

30. Je n'ai point parlé non plus des tumeurs plus ou moins pédiculisées, soit sous-péritonéales, soit intra-utérines. Je serais cependant disposé à croire que l'électrolyse aide à l'enucléation de ces tumeurs; en effet, j'ai constaté, après traitement, la formation de 6 polypes dans ma clientèle. Cette proportion, sur 97 malades, *me semble dépasser la moyenne.*

Le Dr HEURTATX, membre de l'Académie de médecine, professeur de clinique chirurgicale à l'école de médecine de Nantes, m'a envoyé 16 malades.

Le Dr LOUIS FOISSON, professeur suppléant de chirurgie à l'école de Nantes, m'a adressé 2 clientes.

Le Dr BERNAUDEAUX, médecin des Hôpitaux, 3.

Le Dr MENAYER, également 3.

Le Dr CHENANTAIS, professeur de clinique chirurgicale à l'école de médecine, 2.

Les Drs ATTIMONT et GRUGET, l'un, médecin suppléant, l'autre, chirurgien suppléant des Hospices, chacun 1.

Le Dr ALBERT MALHERBE, professeur à l'école de médecine, 2.

Le Dr P. JORON, membre correspondant de l'Académie de médecine, professeur à l'école de médecine de Nantes, 1.

Enfin, le Dr OLLIVÉ, professeur suppléant à l'école de médecine, également 1.

Sur les 16 malades du Dr. Heurtaux, 10 ont été guéries; je trouve en effet que l'on peut considérer comme telles les femmes chez qui tous les phénomènes morbides ont disparu, lors même qu'il reste un noyau amoindri ne causant plus aucune gêne.

10 d'entre elles avaient des hémorrhagies; toutes les ont vues disparaître, à l'exception d'une seule.

Chez 5 d'entre elles, il a suffi de 3 à 7 séances pour amener la disparition des pertes. Chez les 4 autres, il a fallu plus de 10 séances pour arriver au même résultat.

Chez 5 femmes portant des tumeurs volumineuses, quelques-unes énormes, on a observé une segmentation remarquable de la masse. Il en est résulté une diminution du volume total.

Chez 2 autres, des fibromes adhérents et immobiles se sont mobilisés en se rétractant.

Enfin, deux de ces malades n'ont éprouvé aucune amélioration.

Je ferai remarquer que chez presque toutes ces femmes, les hémorrhagies ont disparu avant que la tumeur ait diminué d'une façon bien sensible.

Il en a été de même des douleurs, et, en somme, d'à peu près tous les phénomènes morbides, sauf parfois ceux dus à la compression.

Sur les deux malades du Dr. Foisson, l'une, a vu ses pertes disparaître après 11 séances sans que la tumeur ait éprouvé une modification bien apparente. Il est arrivé à la seconde un accident qui a tout interrompu.