

REVUE DES JOURNAUX

MEDECINE.

Valeur pronostique de l'hémoptysie dans la tuberculose.—
Traitement.—Clinique de M. le professeur Jaccoud, à l'hôpital de la Pitié.—Le pronostic de l'hémoptysie dans le cours de la tuberculose est fondé sur des caractères assez précis et qu'il est indispensable de pouvoir apprécier à leur valeur. Les trois observations suivantes, relatives à des malades qui se sont trouvés en même temps dans le service, en sont des exemples très instructifs.

Le premier, âgé de 38 ans, a été pris brusquement d'une hémoptysie très abondante qui a duré onze à douze jours, elle a été accompagnée d'un mouvement fébrile très léger qui n'a duré que deux jours, point fort important au point de vue du pronostic.

Un second malade, âgé de 23 ans, a été pris brusquement aussi d'une hémoptysie très abondante qui a continué par reprises et ne s'est terminée aussi qu'au bout d'une dizaine de jours. Il n'y a pas eu de fièvre au début, mais au bout de six jours, celle-ci a éclaté brusquement, et, à l'inverse du précédent qui a eu un vestige de fièvre hémoptoïque initiale; en ce cas, la fièvre n'a été que secondaire. On aurait pu croire aussi que chez lui l'hémoptysie était initiale et que ce malade était à la première période de la tuberculose; cependant, en l'interrogeant avec soin, on constata qu'il toussait depuis quelque temps déjà, et de plus on reconnut l'existence de bacilles dans les crachats dès les premiers jours de l'entrée; or les bacilles ne se rencontrent ainsi qu'à une période beaucoup plus avancée de la maladie.

Enfin, une femme de 26 ans a été atteinte d'une hémoptysie qui a duré quinze jours environ avec une interruption de trois à quatre jours. Mais chez elle, la fièvre hémoptoïque a été initiale, très forte, persistant pendant toute la durée de l'hémoptysie et après sa cessation. Quant au début de la tuberculose, il remontait à deux ans environ.

Ces trois cas sont des exemples d'hémoptysie très franche ayant paru soudainement au milieu d'une santé considérée comme bonne, mais liées pourtant à la tuberculose et non initiale malgré les apparences. Cette distinction est capitale dans la pratique, car il est tout différent d'avoir affaire à une tuberculose à son début ou à une tuberculose plus ou moins ancienne. Il faut donc chercher avec le plus grand soin tout ce qui peut être de quelque