

attache de chaque côté, ayant le soin de ramener sur eux-mêmes les derniers fils noués et de les attacher de nouveau en comprenant tout le pédicule dans une ligature en masse. Une telle ligature ne peut pas glisser. Le gros catgut de bonne qualité et convenablement préparé est pour cette fin même plus sûr que la soie, car le catgut se contracte lorsqu'il est mouillé.

On peut facilement en avoir la preuve. On attache avec la soie et le catgut, plaçant les fils à une faible distance l'un de l'autre, un morceau de laminaria distendue, puis on le jette dans l'eau, au bout d'une heure ou deux, le catgut produira une forte constriction sur cette substance élastique, tandis que la ligature de soie exercera toujours la même pression qu'au moment où elle aura été appliquée. S'il y a de vastes adhésions, il faut faire de petites sutures au catgut; pour l'exudation qui se produit, une abondante irrigation avec de l'eau très chaude est suffisante pour la contrôler. Souvent m'attendant, à beaucoup d'exudation, j'ai fermé l'abdomen après avoir placé le tube à drainage, puis après avoir passé les 24 heures suivantes très inquiet, je n'ai pas retiré du cul de sac de Douglas plus d'un demi once de liquide. Lorsque l'intestin est déchiré les sutures de Lambert arrêteront mieux l'hémorrhagie que le galvano-cautère. Ainsi, dans un cas où, après un mois, j'eus l'occasion de faire une seconde opération pour l'enlèvement d'un abcès de l'ovaire resté en place, je trouvai qu'une petite surface intestinale que j'avais touchée avec le galvano-cautère, afin d'arrêter l'hémorrhagie était ferment agglutinée avec les circonvolutions intestinales avoisinantes, dont il était impossible de la détacher. Je pense que nous pouvons nous exempter d'introduire les astringents dans l'abdomen, le perchlorure de fer, par exemple, dans tous les cas où j'ai entendu dire qu'on en avait fait usage les patientes moururent de péritonite. La pression au moyen de la gaze stérilisée est sûre et semble n'avoir aucun mauvais effet. Sans doute, la plus grande somme d'hémorrhagie est due aux opérations trop longtemps prolongées, ainsi sous le titre : Opérations prolongées, on peut inclure non seulement la plupart des cas de décès dus à l'hémorrhagie, mais encore ceux qui proviennent d'une trop longue anesthésie, car c'est précisément le trouble que donne le décollement des adhésions et l'arrêt de l'hémorrhagie qui en résulte, qui retarde l'opération, cependant, l'anesthésie prolongée est elle-même une des principales causes du mauvais résultat de l'opération. Le tube à drainage est une sentinelle vigilante qui nous avertit de l'hémorrhagie et pour cette seule raison, il faut continuer de l'employer. Voici les objections qui sont contre lui : 1ère, il donne une porte d'entrée aux germes septiques et 2ème, la petite ouverture qu'il occupait reste faible et peut donner lieu par la suite à une hernie des parois abdominales.

La première objection doit être mise de côté, car si la garde-malade qui est chargée de vider le drain prend les précautions