

que de la maladie de Basedow. Les troubles de développement du myocarde sont de nature réflexe chez ceux qui souffrent d'hypospadias, de phimosis ou de paraphimosis, etc... Pour tous ces malades, la thérapeutique doit d'abord s'arrêter à la chirurgie qui remédiera à un trouble local dont l'action réflexe peut donner lieu à une dégénérescence du muscle cardiaque hypertrophié.

Le régime alimentaire sera réduit au minimum de recette nécessaire pour l'entretien calorique de l'organisme, en rapport avec le travail du sujet, il faut soulager le cœur en cherchant à diminuer la masse du sang et des liquides de l'économie. Le thé, le café, les vins, la bière, etc., toutes les boissons stimulantes et les aliments liquides, soupe, potage, etc., seront évités, ainsi que les légumes trop riches en sels de potasse, comme la pomme de terre qui contient environ 3 grammes (45 grains) de phosphate de potassium par deux livres. Le régime sec, les viandes blanches, rôties ou grillées, sont préférables. Pour activer la circulation périphérique et celle du réseau veineux, le massage, les mouvements passifs, la gymnastique méthodique, les bains tièdes ou chauds, sont indiqués.

Les bains chlorurés sodiques seront chargés d'acide CO_2 et donnés à la température de 27 à 35° (82 à 85 F); les éléments gazeux et minéraux de l'eau produisent une excitation cutanée, une vaso-dilatation et une stimulation des nerfs sensitifs qui ont un effet des plus favorables sur le cœur. Si, en concomitance à l'hypermyose, il existe une dilatation, la matité précordiale diminue rapidement et après un bain chaud à 32° C (89 F.) l'on voit souvent le diamètre transversal du cœur diminuer de plus de 2 centimètres (1 pouce). L'idéal du traitement serait de pouvoir donner, à ce cœur capable de nourrir un organisme plus robuste, des organes plus grands et des muscles plus gros, proportionnés ainsi à son énergie; cependant les exercices corporels, des marches prolongées, des ascensions méthodiques, etc., sont contre-indiqués, car cette méthode d'Oertel est appliquée avec succès de préférence dans les cas d'hypomyose ou de simple affaiblissement musculaire du cœur.