

2. Gén. Héron de nuit. *Nyctiardea*, Swainson.

Bec très fort, à sommet courbé dès la base; bout de la mandibule supérieure un peu recourbé. Tarses courts, égaux au doigt médian. Doigt latéral extérieur un peu plus long que l'intérieur. Tête sans huppe, mais munie d'une longue aigrette composée de trois plumes roulées ensemble. Cou assez court et modérément emplumé en arrière.

Une seule espèce.

**Le Héron de nuit de Garden.** *Nyctiardea Gardeni*, Baird. *Ardea Nycticorax*, Wils. *Nycticorax americanus*,—Bonap. Angl. *Night Heron*; *Qua-Bird*.—Longueur 25 pouces; ailes 12.50; envergure 44; tarses 3.15; bec 3.10 pouces. Dessus de la tête et milieu du dos d'un noir verdâtre; ailes et queue d'un cendré bleuâtre. Dessous, front et aigrette, d'un beau blanc. Longueur de l'aigrette 8 à 9 pouces.

E. et C.—Les Hérons de nuit ne se rencontrent guère le jour que dans leurs héronières, c'est-à-dire, dans les endroits qu'ils ont choisis pour y placer leurs nids en société. Ces héronières sont ordinairement établies dans des marais ou des forêts isolées, solitaires. Il en existe une dans l'Île d'Orléans et une autre à Laval, près de Québec, qui sont habitées chaque année par un grand nombre de ces Echassiers qui y font leur ponte. Les trois plumes de l'aigrette mesurent de huit à neuf pouces, leurs barbes sont très courtes et disposés de manière que ces plumes s'emboîtent les unes dans les autres dès qu'on les sépare. La femelle pond de 3 à 4 œufs d'un vert léger, teint de de bleuâtre.

3. Gen. Ardette. *Ardetta*, Gray.

Bec grêle, aigu, courbé. Jambes très courtes, tarses plus courts que le doigt médian. Doigt intérieur le plus long. Ongles courts, aigus. Queue à 10 penes molles. Cou court, dépourvu de plumes à la base, en arrière. Point d'aigrette.

Une seule espèce.

**Ardette petite.** *Ardetta exilis*, Gray. *Ardea* Gmel. *Ardeola*,