

3^o Que les fractures compliquées de plaies ne se consolident que par la formation de granulations, c'est-à-dire par seconde intention, tout comme les plaies de la peau restées béantes. Leur guérison est beaucoup plus longue que celle des fractures simples.

4^o Que la gravité de ces fractures compliquées est d'autant plus grande que l'os est enflammé profondément.

COMMUNICATIONS.

Traitement de la diphthérie.

MM. les Rédacteurs,

Il y a déjà longtemps, j'ai reçu du Dr Bell, de Glasgow, une communication au sujet du traitement de la diphthérie.

En comparant ce traitement à celui publié dans l'*Union Médicale*, en 1878, comme étant celui du Dr Bell, je vois qu'il y a eu alors des erreurs commises, tant dans la composition des remèdes que dans les indications à suivre, etc. Vu que la diphthérie existe encore parmi nous et que ces erreurs pourraient peut-être compromettre le succès du traitement, auriez-vous l'obligeance de publier cette prescription du Dr Bell dans votre journal.

R.—Ferri chloridi tinct.....	ʒiii
Acid sulphurosi.....	ʒiiss
Pot. chlorat.....	ʒiii
Glycerini	ʒi
Aque ad.....	ʒvi

Une cuillerée à dessert toutes les deux heures, pour un enfant d'à peu près 15 ans. On diminue suivant l'âge. (1)

R—Acid carbolic.....	ʒi
Acid sulphurosi.....	ʒiii
Solut ferri perchloridi.....	ʒss
Glycerini.....	ʒss

Cette solution est appliquée sur les taches diphthéritiques toutes les deux heures, (alternant avec les cuillerées de la potion) au moyen d'un pinceau (*camel's hair pencil*) ou du pulvérisateur (*spray*). Elle doit être employée jusqu'à ce que toutes les taches soient disparues et toujours de la même force, quelque soit l'âge du malade. Si elle produit beaucoup d'irritation, le Dr Bell l'atténue généralement au moyen d'une application de glycérine et de borax (selon la B. P.) Dans les intervalles on rince souvent la bouche (et la gorge aussi je suppose) avec une faible solution de permanganate de potasse.

Le Dr Bell recommande de supporter les forces du malade dès le début au moyen des stimulants en quantité suffisante et à doses répétées selon les indications; la tolérance est parfois considérable. De plus, nourriture abondante, sous forme de soupe, gelée, lait, etc. Il faut renouveler l'air constamment. On peut le faire en toute sai-

(1) Cette dose recommandée par le Dr Bell ne me paraît pas bien forte, il serait peut être préférable de l'augmenter; je l'ai donnée à des enfants beaucoup plus jeunes. Dr. R