

302 HISTOIRE NATURELLE

tions striées transversalement, toutes courtes et larges; les stigmates latéraux, et plus élevés.

Batsch, Bandw. fig. 110, 113. *Werner*, Verm. Intest. tab. 3. fig. 47, 57.

Se trouve dans les intestins de l'homme; a 10 à 12 pieds de long.

Tænia du phoque, *Tænia phocæ*.

La tête longue, à quatre côtés, avec quatre oreilles. Se trouve dans les intestins du phoque barbu.

Tænia baccillaire, *Tænia baccillaris*.

Tête arrondie, antérieurement pyriforme; les articulations très-étroites; le cou non articulé.

Goeze, Eingew. tab. 27. fig. 4, 5. *Batsch*. Bandw. fig. 122, 123. Encycl. pl. 43. fig. 18, 19.

Se trouve dans les intestins de la taupe.

Tænia pectine, *Tænia pectinata*.

Oblong, lancéolé; la tête échancrée; le cou à peine visible.

Batsch, Bandw. fig. 89, 168. *Goeze*. Eingew. tab. 27. fig. 7, 13. *Pallas*, Beytr. 1. tab. 3. fig. 25, 27. Journal de Phys. septembre 1778, pl. 2. fig. 3. Ency. pl. 44. fig. 7, 8.

Se trouve dans les intestins du lièvre, du lapin et de la marmotte.

Tænia de la brebis, *Tænia ovina*.

Les articulations courtes, arrondies des deux côtés; des vésicules latérales transparentes; les stigmates doubles et marginaux.

Bloch, Eingew. tab. 5, fig. 1, 5. *Goeze*. Eingew. tab. 28. fig. 1, 12. *Batsch*. fig. 109, 162.

Voyez pl. 10 fig. 2 et 3, où sa partie antérieure