

TROUBLES GASTRIQUES

HEMATEMESE.

Dr Joseph GUERARD,

Professeur de pathologie interne.

C'est le vomissement de sang provenant de la partie supérieure du tube digestif.

Il existe un traitement uniforme : les indications varient suivant que le vomissement est abondant, de moyenne ou de faible intensité.

Hématémèse abondante : Dans certains cas, rupture de la coronaire stomachique ; rupture, dans l'estomac, de l'aorte abdominale athéromateuse ou anévrysmales, la mort survient avant l'arrivée du médecin.

Une hématomèse abondante n'est pas toujours mortelle, et le médecin doit aussitôt instituer un traitement d'urgence ; il est bon de n'utiliser d'aucun moyen local interne.

Malade au repos absolu, immobilité la plus complète, défense de parler, de tousser, même si le besoin s'en fait sentir et, chose très importante, rassurer le malade, le persuader qu'il ne va pas mourir.

S'il y a menace de syncope, on pratiquera les injections de sérum artificiel et, en même temps, on donnera avec la seringue de Pravaz : huile camphrée, caféine, éther, ergotine.

Si vous n'avez pas d'ampoules d'ergotine toutes prêtes, vous pouvez formuler :

Ergotine Tanret	0.01 cgr.
Acide lactique	0.02 cgr.
Eau distillée	10 gr.

1 c.c.—1 milligramme — ou

Ergotine Bongeau	2 gr.
Eau laurier cerisé	} à 10 gr.
Glycérine pure	

1 c.c. — 0.10 d'ergotine, ou 8 à 15 gouttes de la solution d'adrénaline.

On met une vessie de glace au creux épigastrique avec une flanelle interposée.

On a conseillé de la glace dans le rectum ; à la région des bourses, des lavements très chauds. Par réflexe il se produirait une constriction qui favoriserait la formation du caillot oblitérant.

Si le pouls devient follet et la syncope imminente, il faut donner du sérum artificiel, 3 à 500 gr. ou 0.50 à 1 gr. de caféine dans les muscles. D'aucuns préfèrent les injections intra-veineuses, et même la transfusion sanguine, ce qui n'est pas toujours praticable.

Aucune alimentation, à part quelques petits fragments de glace pour calmer la soif.