

THERAPEUTIQUE

CANCER DE L'ESTOMAC

PAR LE DOCTEUR G. LEMOINE

Lorsque les symptômes dyspeptiques se montrent chez une personne d'un certain âge, alors même que sa santé eût été parfaite jusque-là, on peut redouter un cancer de l'estomac. Cette crainte augmente si, à la diminution de l'appétit, viennent s'ajouter des nausées, et, à intervalles plus ou moins espacés, des vomissements glaireux ou alimentaires, qui laissent à leur suite une douleur profonde difficile à localiser. Cette période initiale peut durer longtemps et l'acuité des symptômes qui se montrent alors est très variable. Cependant les vomissements sont à peu près constants ; au début ils surviennent le matin et sont glaireux à peu près comme ceux des alcooliques ; plus tard, ils sont alimentaires et se produisent un certain temps, parfois plusieurs heures, après les repas. Comme l'estomac subit presque toujours une dilatation assez grande, les aliments s'y accumulent, et cela d'autant plus volontiers que souvent la sténose du pylore s'oppose à leur passage dans l'intestin ; aussi peuvent-ils n'être vomis que plusieurs jours après avoir été ingérés. A cette période, la constipation est de règle ; il en est de même de la douleur qui, en général, est continue, sourde exaspérée par la pression et par l'ingestion des aliments. Elle peut s'accompagner d'un point spinal et d'irradiations dans les hypocondres.

A mesure que la maladie fait des progrès, les symptômes changent. Les vomissements, très fréquents, deviennent souvent hémorragiques et prennent l'apparence d'un putrilage noirâtre que l'on compare à du marc de café. Cet aspect est dû à ce que le sang séjourne dans l'estomac avant d'être rejeté et subit un commencement de digestion. La constipation est remplacée par de la diarrhée, et quelquefois les selles sont noirâtres et contiennent du sang digéré en partie. La cachexie va en s'accroissant à mesure que l'alimentation devient plus difficile et que la tumeur s'étend, les téguments prennent la couleur jaune-paille caractéristique des cancéreux et souvent l'examen de la région épigastrique fait découvrir des noyaux indurés et bosselés qui précisent le diagnostic.

Parfois les ganglions sus-claviculaires ou ceux de l'aisselle sont engorgés. Aucun aliment ne peut pénétrer dans l'estomac sans provoquer des douleurs atroces et des vomissements, l'amaigrissement devient considérable, des œdèmes cachectiques et même de la phlegmatia alba dolens peuvent apparaître, et la mort peut survenir par inanition ou par le fait d'une des complications si fréquentes chez les malades cachectiques.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Tous les malades atteints de cancer de l'estomac ne présentent pas des symptômes aussi accusés et, bien souvent, le diagnostic reste hésitant. Il existe des cas dans