

4. Si la sonde rencontre un obstacle sur son passage, il faut toujours bien se rendre compte de sa nature et ne jamais employer la force pour le franchir, car la mollesse du tissu utérin rend possible sa perforation.

5. Les injections seront faites avec une solution de bichlorure de mercure à 1 pour 5000 ; en cas de contre-indication, avec de l'eau phéniquée à 2 pour 100.

Chicago, Juillet 1898.

Péritonite tuberculeuse, tuberculose génito-urinaire

Traitement par les injections sous-cutanées d'huile Gaiacolée
(AMPOULES VAUTHIER-MARÇQ)

PAR

M. LE DOCTEUR DESTERNES

M. X. . . , âgé de 34 ans, est né à Paris. Son père est mort d'un cancer du larynx, sa mère de phthisie galopante à 23 ans.

Ses antécédents personnels, très chargés, nous le montrent d'une constitution lymphatique, d'un tempérament nerveux.

A 16 ans, éruption impétigineuse de la face, suivie d'adénite sous-maxillaire volumineuse.

A 20 ans, nous le voyons, d'après ses souvenirs, affecté de grosses amygdales, de végétations adénoïdes, de malformations nasales. Respirant péniblement, sommeillant la bouche ouverte, il est sujet à des coryzas, rhumes, enrrouements, amygdalites répétées, que l'excision des amygdales, les cautérisations et lavages multiples parviennent difficilement à atténuer.