

♂—Semblable à la ♀, à l'exception des hanches postérieures qui n'ont que l'extrémité de blanche, le reste étant jaune-miel.

Capturé au CapRouge et à Ottawa.

15. **Strongylogastre en-deuil.** *Strongylogaster luctuosus*, n. sp.

♀—Long. .31 pcc. Noir avec les pattes rousses. Toute la bouche noire. Une large tache sur les bords latéraux du prothorax, les écailles alaires avec les pattes, roux. Ailes hyalines, le costa roussâtre, le stigma et les nervures, noir; la cellule lancéolée sans nervule transverse, les ailes inférieures avec 2 cellules médianes. Toutes les hanches noires, les postérieures plus ou moins rousses à l'extrémité, les tarses postérieurs bruns à l'extrémité. Abdomen noir avec une large tache rousse couvrant les segments 1, 2, 3 et 4, une semblable tache lui correspondant sous le ventre—Ottawa (Harrington).

Très rapproché du *rufocinctus*, Nort., mais s'en séparant distinctement par l'absence de nervule transverse à sa cellule lancéolée.

16. **Strongylogastre très-proche.** *Strongylogaster proximus*, n. sp.

♀—Long. .32 pcc. Très rapproché du *pallicoxus*, Prov., en différant seulement par les caractères suivants: écusson blanc, écailles alaires blanc-roussâtre; abdomen un peu plus fort avec la base et l'extrémité, noir, cette dernière avec le segment terminal blanc.—Ottawa (Harrington).

19. Gen. TENTHREDO, Leach, p. 219 et 745.

Aux 25 espèces décrites, ajoutez les 4 suivantes.

26. **Tenthrede sérieuse.** *Tenthredo cogitans*, Prov.

Allantus cogitans, Prov.—Faune, Hym. p. 211.

27. **Tenthrede des-montagnes.** *Tenthredo montana*, n. sp.

♀—Long. .40 pcc. Noire; le chaperon, le labre, les mandibules excepté à l'extrémité, une tache sur les joues, les bords latéraux du prothorax, avec une tache au haut des hanches postérieures et une autre sur les côtés des plaques basilaires, blanc. Le chaperon