

162 DIDYNAMIA GYNOSPERMIA.

TEUCRIUM

- composita-*
tum.
1. **TEUCRIUM** foliis multifidis, floribus solitariis.
Teucrion foliis cuneiformibus trifidis: lacinia divisa, floribus solitariis. *Roy. lugd. 306.*
Teucrion, calyx campanulato, laciniatum, flore magno & parvo subcæruleo. *Boerh. lugd. 1. p. 131.*
Habitat in Oriente.
 2. **TEUCRIUM** foliis multifidis, floribus racemosis.
Teucrion foliis pinnatifidis, laciñiis linearibus, infimis divisis, notibus racemosis. *Hort. cliff. 301. Roy. lugd. 307.*
Teucrion orientale angustifolium laciniatum, flore magno stauernbente. *Tournef. sur. 14.*
Habitat in Oriente.
 3. **TEUCRIUM** foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis.
Teucrion foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. cliff. 301. Roy. lugd. 306. Dalib. paris. 171.*
Sauv. monsp. 248.
Botrys chamaedryoides. *Bauh. pin. 138.*
Chamæpitys altera. *Dod. pent. 46.*
Habitat in Germania, Gallia, Helvetia, Italiae aprius cultis. ♂
 4. **TEUCRIUM** foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis subracemosis, caule erecto.
Chamæpitys spuria, multifido folio, lamii flore. *Bauh. pin. 250.*
Pseudochamæpitys. *Clas. hist. 2. p. 185.*
Chamæpitys alia. *Cam. epie. 680.*
Habitat in Hispania.
 5. **TEUCRIUM** foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus. *Hort. npf. 160. Mat. med. 287.*
Teucrion foliis simpliciter trifidis. *Hort. cliff. 301. Roy. lugd. 306. Gaert. Stamp. 2. p. 248. Gros. virg. 64.*
Dalib. paris. 173. Sauv. monsp. 175.
Chamæpitys lutea vulgaris L. folio trifido. *Bauh. pin. 249.*
Chamæpitys prima. *Dod. pent. 46.*
Habitat in Italia, Gallia, Anglia, Hungaria, Helvetia arvis. ♂

6. TEU-