

very large doses of the tartrate of Antimony, without producing, to the fullest extent, that complete prostration of the animal powers, so desirable, previous to attempting a reduction of dislocation of the hip joint.

It is only fair, for the writer, to add, that when the second surgeon arrived at the place, the first was, "*non est inventus, evasit, erupit*"! and when sent for, as in due courtesy bound, the answer was, "Oh! he can do it very well himself; he does not require my assistance"!!! These remarks and hints are, of course, only intended to guard against the pernicious and indiscriminate use of the lancet, when syncope follows the accident; where an opposite state is found, the surgeon will not hesitate, it is presumed, to bleed his patient.

Should these observations and remarks, perhaps considered too diffuse and prolix by some, the result of upwards of a thirty six years extensive practice in the old country and Canada, prove beneficial to the junior members of the Profession, and be the humble means of saving only one sufferer from a premature grave, or one poor fellow creature from being crippled for life, the object will be gained, and no trifling degree of sincere gratification bestowed on,

Gentlemen,

Yours, very respectfully

JOHN MEWBURN. M. R. C. S. L.

Danby House, Stamford, M. D.

---

AUX ÉDITEURS DE LA GAZETTE MÉDICALE DE MONTRÉAL.

MESSIEURS,—Je vous prie d'avoir la bonté d'insérer dans votre intéressant journal la communication suivante, d'un cas remarquable d'une grossesse extra uterine, terminant en la troisième année par expulsion par le rectum d'un Fœtus d'environ six mois et la guérison de la malade.

J'ai l'honneur d'être,

Messieurs,

Votre très obéissant serviteur,

W. A. R. G.

Madame B. de la Paroisse de St. Grégoire âgée d'environ 25 ans jouissante généralement d'une assez bonne santé, devint enceinte pour la seconde fois en le mois d'Octobre 1841, se plaint de symptômes extraordinaires et différents à ceux qu'elle éprouva pendant le commencement de sa première grossesse, ses malaises devinrent de plus en plus insupportables à mesure que la gestation progressait.

Le 5e. mois les mouvements et les autres signes de la vitalité de l'enfant cessèrent, elle éprouva des douleurs comme des coliques accompagnées de faiblesses, de syncope, et qui durèrent plus ou moins