

douteuse. Enfin, pour Carpary, Unna, ce serait une manifestation de la cachexie infantile.

On pourrait confondre cette affection avec des plaques muqueuses qui dépendent presque toujours de la syphilis héréditaire. Ces dernières ont une teinte grisâtre, une proéminence plus marquée; de plus, elles ont une grande ténacité et coïncident avec d'autres manifestations syphilitiques.

Les ulcérations aphteuses sont précédées de vésicules; ces ulcérations elles-mêmes ont leurs bords taillés nettements, sont arrondies, entourées d'un aréole d'un rouge vif et recouvertes de pus; enfin, comme la maladie se fait généralement par poussées, il est habituel de constater simultanément la présence d'ulcérations et de vésicules. Tous ces caractères sont assez nets pour que le diagnostic avec des manifestations syphilitiques soit des plus faciles.

Ils me reste à vous parler de la glossite tuberculeuse et du cancroïde. Je serai plus bref sur le diagnostic de la syphilis et de ces deux maladies, car vous le trouverez exposé dans tous vos livres classiques.

La glossite tuberculeuse serait essentiellement caractérisée par la présence de petites granulations miliaires jaunâtres autour de l'ulcère. Malheureusement, ces granulations sont rares, et Fournier ne les a vues que deux ou trois fois sur trente cas. On doit donc, en dehors des caractères de l'ulcère, s'appuyer sur l'état spécial du malade et les manifestations pulmonaires de la tuberculose. L'ulcération tuberculeuse siège habituellement sur la face supérieure de l'organe et coïncide parfois avec des ulcères palatins pharyngiens ou amygdaliens; elle est généralement unique, se faisant par jonction de plaques initiales. La surface de la perte de substance est superficielle, sans anfractuosités ni végétations, son fond est noir, grisâtre, gris-jaunâtre, et présente parfois les points jaunâtres caractéristiques. Le seul point de ressemblance avec la gomme est la production possible d'une cavité profonde intra-musculaire. Les troubles fonctionnels sont très peu accusés et les ganglions souvent normaux.

Le diagnostic du cancroïde doit être fait avec soin, car dans quelques cas, on a opéré à faux. Avant l'ulcération, on peut confondre la gomme et l'épithéliome sous muqueux. Le plus généralement, il y a plusieurs gommages à la fois, les anciennes cicatrices syphilitiques sont fréquentes; les leucomes, la glossite superficielle chronique feront surtout pencher vers la tumeur maligne. Cependant la glossite scléreuse est fréquemment, vous vous le rappelez, d'origine syphilitique et, de plus, l'épithéliome peut se développer sur une langue syphilitique. Dans ces cas difficiles, le traitement par l'iodure de po-