

de cire ponctuée, portant sur chaque mandibule 3 à 4 côtes obliques, séparées par des sillons. Ailes moyennes, un peu faibles; la première plume la plus longue. Queue courte; pattes courtes, 3 doigts seulement avec une membrane complète. Plumage très compact.

Une seule espèce dans notre faune.

Le Macareux arctique. *Mormon artica*, Illig.; *Alca arctica*, Linn.—Angl. *The Puffin*.—Long. 11½ pouces; ailes 6½; queue 2½. Bec très comprimé, avec environ 4 côtes obliques se correspondant à la commissure et se dirigeant de là en arrière sur chaque mandibule. Bec jaunâtre, noirâtre à la base. Dessus de la tête, le cou avec tout le dessus du corps, des ailes et de la queue, noir. Gorge et côtés de la tête, blanc cendré; dessous blanc. Un petit espace corné, noir, horizontal à la paupière inférieure, avec un semblable, noir, vertical au dessus de chaque œil. Pattes jaunâtres; ongles noirs.

P. A. C.—Le Macareux arctique, qu'on appelle aussi Macareux commun, M. moine, se rencontre fréquemment dans le Golfe en automne et au printemps. Il semble aussi peu fait pour la marche que pour le vol, le soulèvement d'un seul pied semblant le faire craindre aussitôt pour son équilibre. Il se nourrit de crevettes, de vers marins, crustacés, etc. On le voit souvent associé aux Guillemots, et comme eux il niche sur les rochers, près de la mer.

3. Gen. OMBRIE. *Ombria*, Eschscholtz.

Forme générale courte et robuste. Bec très comprimé, à dos très distinct, et ses bords coupants relevés en haut; mandibule inférieure recourbée en haut, et portant un sillon longitudinal à la base. Ailes moyennes, pointues; queue courte; pattes courtes, fortes.

Une seule espèce.

L'Ombrie perroquet. *Ombria psittacula* Esch.; *Fhaleris psitt.* Temm. Vul. *Le Perroquet-de-mer*; Ang. *The Parrot Auk*.—Long. 9 pc; ailes 5¾; queue 1½. Tête et tout le dessus d'un brun noir, légèrement mêlé de blanc à la gorge; poitrine tachetée de brun et de blanc. Une ligne de plumes blanches en forme de longs poils partant du dessous de l'œil s'étend longitudinalement sur les côtés du cou. Dessous blanc; les côtés au dessous des ailes tachetés de brun cendré. Pattes brunes. Bec orange rougeâtre, plus foncé à la base; pieds, verdâtre foncé.