

Après une durée assez considérable de l'amaurose, nous avons remarqué une guérison partielle de la vue. Des observations ophtalmoscopiques de ces cas pourraient peut être jeter de la lumière sur les symptômes nerveux qui surviennent après une perte considérable de sang.

Une sensation douloureuse à la tête et une diminution des facultés intellectuelles, sont des symptômes qui peuvent être causés par des changements dans le cerveau, semblables à ceux que l'on remarque dans la rétine. Il est affirmé que l'helminthiase est cause de maladie des yeux, plus spécialement encore d'une dilatation insuffisante de la pupille, mais aucune observation récente et déterminée, n'a été publiée sur ce sujet.

Il est bien établi que l'on reconnaît la jaunisse par des taches jaunes sur la conjonctive.

Dans la leukémie splénique, la rétine plus particulièrement peut devenir le siège de tumeurs proéminentes semblables à celles que l'on trouve dans le foie, les reins, les plèvres, les carotides, etc., dû à la sortie des corpuscules blancs et rouges du sang à travers des vaisseaux sanguins devenus grasseux. En examinant avec l'ophtalmoscope ces cas de leukémie de la rétine, l'arrière chambre est d'une couleur jaune orange. Les veines rétinales apparaissent indurées, tendues, tortueuses et de couleur rouge, les artères rétrécies et d'une couleur jaune pâle, des taches jaunâtres peuvent aussi apparaître dans la rétine qui disparaissent, pour revenir un peu plus tard. La leukémie de la rétine n'est pas un symptôme invariable de la leukémie générale.—*Pac. Med. Journal.*

(A continuer.)