

un pouls de 90. Il n'y avait pas eu d'évacuation intestinale, mais elle avait "bien" uriné. Pas de frisson. Croyant que la fatigue et le manque de sommeil étaient cause de tout cela, je prescrivis, un peu de brandy et d'eau, quelques bouillons, et la plus parfaite tranquillité. A ma visite du soir je trouvai ma malade pire. Elle n'avait pas dormi et les douleurs de tête avaient augmenté, la température était de 101.5 F. et le pouls qui était petit, dur, battait 110. De plus elle était très agitée, lançant ses bras et ses jambes d'un côté et d'autre. Elle n'avait pas eu de frisson, pas de garde robe, mais elle avait uriné. Je prescrivis 15 grains d'antipyrine, à prendre immédiatement dans un verre à vin d'eau, et une cuillerée à dessert de sirop de chloral à prendre une heure après la poudre, avec instruction de répéter la dose une demie heure plus tard, s'il n'y avait pas sommeil. J'ordonnai à la garde de faire uriner la malade dans un vase propre, et de conserver l'urine, que je voulais examiner à ma prochaine visite. Le lendemain au matin, je trouvai ma malade encore plus souffrante que la veille. La température était à 104, le pouls à 120, et les douleurs de tête atroces. Elle avait pris durant la nuit quatre doses de sirop de chloral de demie heure en demie heure et malgré cela, n'avait pas dormi une heure. Depuis la veille, elle n'avait passé qu'environ un verre à vin d'urine, que la garde n'avait pu conserver. J'appris alors que depuis au-delà d'une semaine avant son accouchement, Mme C. n'avait uriné qu'une fois par jour, et en très petite quantité et que depuis la quantité d'urine avait encore diminué, qu'elle ne croyait pas avoir passé une roquille d'urine depuis qu'elle était accouchée, que si elle m'avait dit qu'elle urinait bien, c'était parce qu'elle n'éprouvait pas de douleur en urinant. J'ordonnai de suite le mélange salin de Gross, à la dose de un verre à vin toutes les deux heures, avec 15 gouttes de teinture de Veratrum Viride, par dose, et le régime lacté pur fut institué. A ma visite de l'après-midi, je trouvai ma malade couverte de sueur, la température à 101.4 F. et le pouls à 80. Elle avait passé près d'une chopine d'urine et avait une selle aqueuse abondante. Les douleurs de tête avaient beaucoup diminué et elle avait dormi un peu. J'examinai l'urine qui contenait beaucoup d'albumine. Je réduisis les doses de Veratrum de moitié et j'ordonnai de les donner toutes les six heures seulement. Le régime lacté fut continué. Le lendemain au matin Mme C. était relativement bien. La température était normale. Le pouls était à 70. Elle avait eu trois selles liquides durant la nuit et avait uriné abondamment. Elle avait dormi durant plusieurs heures et les douleurs de tête étaient complètement disparues. Dès ce moment la convalescence fut rapide.

Comme on peut en juger par cette observation, des symptômes graves d'urémie qui, à brève échéance, auraient pu se terminer par des convul-