tigo et l'ecthyma et appelée impetigo herpétiforme (Herba, Kaposi). Cette dénomination ne me parait pas bonne, car les pustules qui se produisent au cours de cette maladie ne sont pas des pustules psydaciées; ce sont des pustules à base profonde, rappelant celles de l'ecthyma.

L'impetigo herpétiforme se rencontre exclusivement chez les femmes enceintes et au cours de la grossesse. Il paraît être non pas le résultat d'une inoculation externe mais la détermination cutanée d'une infection interne.

Il s'accompagne toujours d'un état général très grave. La fièvre intense peut atteindre 40. Il siège au ventre, autour de l'ombilie, parfois aux aines, autour du sein. En somme, il siège au trone qu'il envahit par poussées successives, séparées par des intervalles de temps plus au moins longs.

Les pustules sont pecites, véritablement miliaires. Leur base est dure, rouge, enflammée. Rompues, elles donnent naissance à des croûtes brunâtres, adhérentes qui ressemblent bien plus à celles de l'ecthyma qu'à celles de l'impetigo.

Evoluant avec une fièvre vive, comme je l'ai dit, avec un état général qui s'aggrave de plus en plus, la maladie finit cons tamment par la mort.

Ainsi donc, l'impetigo herpétiforme par son étiologie, par 'as pect de ses lésions, pustules et croûtes, par leur siège, par son évolution et par sa terminaison diffère absolument de l'impetigo.

Il est également tout à fait distinct de l'exhyma qui a une cause externe et qui laisse les individus en état de santé. On ne le confondra pas non plus avec cet exhyma symptomatique qu'on voit au décours de certaines grandes maladies et dont je vous parlerai tout à l'heure.

L'impetigo herpétiforme est une affection rare et quoi qu'ayant été bref à son sujet, je m'arrêterais à ce point si je n'avais à dire son diagnostic différentiel avec l'herpès gestationis. dont certains auteurs ne le séparent pas. Ils n'ont cependant rien de commun; ni l'élément morphologique, ni l'évolution, ni le pronostic.

Herpès gestationis est un mot nouveau, mais qui désigne une chose connue depuis longtemps, un pemphigus, pemphigus prurigineux des auciens, pemphigus chronique hénéa, aujourd'hui dermatite herpétiforme de Duhring. La seule différence entre cette dermatite et l'herpès gestationis c'est que celui-ci est lié à l'état de grossesse.

Il apparait pour la première fois chez une femme, alors qu'elle est enceinte et disparait avec cette première grossesse.