

| | |
|---|--------------|
| Elixir parégorique..... | XII gouttes. |
| Sirop simple..... | 5 gr. |
| D. S. Une cuillerée à café toutes les deux heures. (pour un enfant de trois mois). | |

Annales de Méd. et Chir. Infantiles.

— · · · —

La ponction lombaire dans les fractures du crâne; sa valeur diagnostique et pronostique.

— · · · —

Par M. TH. TUFFIER.

Les faits dont je voudrais vous entretenir, et dont l'un a déjà été l'objet d'une communication à la Société de Biologie, ont trait à un nouvel élément de diagnostic des fractures du crâne dans les cas où ces lésions ne se précisent pas par les signes cliniques habituels que nous connaissons tous.

Le 14 mai dernier, un homme de vingt-six ans, renversé par un automobile, est amené à l'hôpital Beaujon. Il n'a que quelques égratignures superficielles ; mais comme il se plaint de douleurs vagues, il est reçu par l'interne de garde. Au bout de deux jours il quitte le service dans lequel il se trouvait, et regagne son domicile à pied. Il revient trois jours après, le 18 mai, et entre dans mon service. Je le vois le 20 mai au matin : il se plaint d'un violent mal de tête ; il est hébété, mais répond cependant aux questions qu'on lui pose ; il a eu dans la matinée une crise convulsive et a perdu par le nez quelques gouttes de sang. Je pense à une fracture du crâne, sans cependant affirmer la chose, à cause du bon état général. Or, après la visite, le malade est repris de nouvelles attaques convulsives auxquelles un médecin assiste, et que ce médecin croit être de nature hystérique.

En présence de telles hésitations, j'ai l'idée de faire pratiquer une ponction lombaire, pensant qu'elle me renseignera au moins sur l'état des enveloppes cérébro-spinales : je retire, en effet, un liquide céphalo rachidien rosé, couleur chair, qui s'écoule avec abondance. Pour être sûr qu'il