

tarse. Dents distinctement visibles au dessous du bord du bec.

La Ridenne Chipeau. *Chaulelasmus streperus*, Gray; *Anas strepera* Lin.—Angl. *Gadwall*; *Grey Duck*.—Long. 22 pces; ailes 10.50; tarses 1.64; commissure 2.04 pouces. Tête et cou d'un blanc sale tacheté de cendré, le sommet de la tête quelque peu rougeâtre. Poitrine et dos noirâtres avec barres concentriques blanches. Côtés du corps zigzagüés de noir et de blanc. Miroir de l'aile d'un blanc pur, bordé extérieurement de gris suivi de noir; couvertures supérieures de la queue noires. Dedans des ailes d'un blanc pur. Bec noir. La femelle a le bec brun, rougeâtre sur les bords.

A. R.—Ce Canard est encore plus rare que le précédent; ce n'est pour ainsi dire qu'accidentellement qu'on le rencontre sur nos eaux en automne. Marchant avec aisance sur le sol, on le trouve parfois dans les champs à la recherche des graines de graminées. La femelle pond de 8 à 12 œufs d'un brun pâle avec légère teinte de verdâtre. Blessé, il n'hésite pas à plonger pour se soustraire aux poursuites.

(A continuer).



PETITE FAUNE ENTOMOLOGIQUE

DU

CANADA.

—

(Continuée de la page 395).

3. Gen. ALÉOCHARE. *Aleochara*, Gravenhost.

Menton très court, largement échanéré. Tête sessile, penchée, non rétrécie en cou en arrière. Labre transversal, tronqué en avant. Antennes courtes, rigidules. Prothorax transversal, aussi large que les élytres, arrondi à sa base et sur les côtés. Elytres courtes, légèrement arrondies à leur extrémité. Abdomen linéaire, quelquefois rétréci en arrière. Pattes peu allongées; cinq articles à tous les tarses. — Corps oblong, assez large, revêtu d'une pubescence non soyeuse.