

Bengalishe Feige. W.

Habitat in India orientali. Fr. (v. v.)

* 15. *FICUS tomentosa.*

F. foliis ovatis integerrimis obtusiusculis subcordatis subtus villosis, receptaculis globosis geminatis tomentosis calyculatis sessilibus. W.

Ficus tomentosa. Roxburgh.

F. (*mollis*) foliis oblongis integerrimis subtus villosis, fructibus axillaribus sessilibus tomentosis. *Vahl symb.*

1. p. 82.

Filzige Feige. W.

Habitat in India orientali. Fr. (v. f.)

Rami teretes tomentosi. Folia petiolata tripollicaria ovata apice attenuata obtusa subretusa, basi leviter cordata, integerrima venosa, supra glabra, subtus villosa. Petioli pollicares tomentosi. Receptacula parva globosa solitaria vel geminata sessilia axillaria tomentosa. W.

* 16. *FICUS venosa.* W.

F. foliis oblongo-ovatis integerrimis acutis basi subcordatis, supra impresso-punctatis, receptaculis geminatis pedunculatis pyriformibus glabris. *Willd. hort. Berol.* 1. p. 36. t. 36. * (*excluso synonymo Aitoni.*)

Adrige Feige. W.

Habitat in India orientali? Fr. (v. v.)

Folia semipedalia vel pedalia oblongo-ovata acuta quandoque obtusa basi obsolete cordata integerrima glabra supra punctis albis impressis sparsis notata. Receptacula cerasi magnitudine pyriformia subgeminata pedunculata glabra, juniora sulcis exarata et punctis albis confersa. W.

* 17. *FICUS coriacea.* †

F. foliis oblongis laevibus basi attenuatis cordatis coriaceis, venis immerfis. *Ait. Kew.* 3 p. 433.

Lederartige Feige. W.

Habitat in India orientali. Fr.

* 18. *FICUS costata.*

F. foliis ovatis cordatis sine profundo angusto, integerrimis glabris acutis utrinque viridibus. *Ait. Kew.* 3. p. 452.

Ger
Hab

* 19. I

F. fo
tri
Leuc
Hab

* 20. I

F. fo
ne
ell
Cato
Citra
Hab
Re
desc
sub
nulla

* 21. I

F. fo
tis
F. (2
vil
F. in
ran
mi
22
Mart
Hab

For
ceola
rima

* 22. F

F. fol
rot
cep
F. (2
lae