

15

les délires alcooliques
DVEL
mois, la consommation
nationale.
par un prêtre qui en a
espérés.

un courant consi-
spattement de nos
établis en Nouvelle
on devrait organiser
pour leur fournir
connatre les avan-
tage le sol généreux
Province à ceux qui
ne s'établir sur

l'initiateur qui fait la
pas la terre qui fait
C'est pourquoi il
homme soit obligé
une terre parce qu'il
is la subsistance de
idis que son successeur
oyen d'y vivre avec

qu'il peut y avoir
se dans deux têtes
; mais il n'est pas
s mettre à l'épreuve
l'avant d'une auto-

DISPARAISSENT
EN 15 JOURS.

oignons pour toujours avec
ent Pedodynes Solvent. La
instantanément. La produ-
apidement que vous pouvez
même deux—de moins pour
de bas.

tuite. Envoyez tout juste
et le traitement complet et
absolu vous sera adressé pour
ons.—Adresses:

TORIES, Dept. C351

Toronto, Ontario.

s de 1 à 10.
" se trouve le total de la
al d'œufs est plus élevé
il du parquet,
—Wyandottes blanches;

ale de Lennoxville.

			Total Points
9	10	H.	T.
5	5	28	1563
6	5	x47	1856
0	4	33	1502
1	0	19	1607
5	0	35	1662
5	4	41	1721
0	0	15	1111
6	0	45	1784
0	0	00	1091
4	5	32	1600
4	4	34	1315
0	4	28	1969
B	4	34	1578
2	5	42	1740
4	6	42	1879
0	1	21	954
6	7	43	1718
0	4	31	1867
4	0	24	1421
2	5	15	868
609	30806	31966	6

LES POULES CESSENT-ELLES DE PONDRE REGULIEREMENT CHEZ VOUS ?

Nourrissez-les convenablement pour la production des œufs.

QUELQUES BONNES RATIONS PRATIQUES ET BIEN BALANCEES:

RATION No 1

Pâtée sèche:	Blé-d'Inde moulu.....	16 lbs
	Déchets de viande.....	6½ "
	Son.....	1 "
	Gru.....	1 "
	Quelques pincées de sel fin.....	
Grains:	Blé-d'Inde concassé.....	2 "
	Blé.....	1 "
	Avoine.....	1 "

RATION No 2

Pâtée sèche:	Blé-d'Inde ou orge moulu.....	2 "
	Son.....	1 "
	Gru.....	1 "
	Déchets de viande ou de poisson.....	1 "
	Du sel fin.....	
Grains:	Blé-d'Inde concassé.....	1 "
	Blé.....	1 "
	Avoine.....	1 "

RATION No 3

Mélange de grains, complet, donné matin et soir dans la Pâtée sèche servie dans le trémis, ouvert l'après-midi seulement:

Composition:	60 lbs de blé.
	60 lbs de blé-d'Inde.
	30 lbs d'avoine.
	30 lbs de sarrasin.

Composition:	60 lbs de blé-d'Inde moulu.
	60 lbs de gru de blé.
	30 lbs de son.
	10 lbs de luzerne hachée.
	10 lbs de tourteaux.
	50 lbs de déchets de bœuf.
	1 lb de sel fin.

Les indications générales données pour la ration 3 ci-dessus sont:

Que la volaille devrait manger une demi-fois, une demi-mesure de plus de pâtée, par poids, que le mélange de grain, car il est reconnu aujourd'hui que la pâtée est l'aliment qui influe le plus sur la production des œufs.

Qu'il est nécessaire de régler la proportion du grain et de la pâtée de manière à ce que les poules aient une nourriture légère dans la matinée et très substantielle dans l'après-midi.

Dans les trois cas, ces rations devraient être complétées avec des betteraves, des choux, de l'avoine germée, du trèfle ou de la luzerne verte ou bien par d'autres succulents.

Le gravier, le charbon de bois, les écailles d'huîtres et le lait ne devraient jamais faire défaut dans le poulailler.

De toute manière, l'alimentation rationnelle est le moyen le plus sûr et le plus pratique de stimuler la production des œufs.

LA JEUNE VOLAILLE COMMENT LA PREPARER A LA PONTE

La jeune volaille, éclos en mars ou avril, commence à fournir sa contribution d'œufs.

Il arrive souvent que de jeunes poules pondent avant d'avoir atteint un développement satisfaisant, ce qui est un grand désavantage, car les poulettes qui sont affectées de cette tendance pondent généralement de petits œufs et elles atteignent rarement un bon record de production.

L'insuffisance de formation physique chez la jeune poule, lorsqu'elle commence à pondre, se traduit généralement en un abaissement de la vigueur du sujet, rendant la poule plus susceptible aux maladies.

A moins qu'un poids de 3½ lbs par poulette soit atteint par la Leghorn, 5 lbs dans le cas de la Rhode Island et 5½ pour la Wyandotte, lorsque les poulettes commencent à pondre, tous les efforts devraient tendre à compléter la formation de la jeune volaille.

Le meilleur moyen de mettre les poulettes en bonne conformation physique serait de leur servir une ration de grains, généralement 10 à 12 lbs de grains, par jour, par 100 poules, complétée d'une quantité limitée de pâtée.

Une pâtée riche et humide composée d'égales parts de moulée, de blé-d'Inde et de moulée d'avoine, arrosée de lait, passe pour être très efficace pour augmenter le poids de la jeune volaille.

Ministère de l'Agriculture de la Province de Québec.

15

15