

Constantin, dans son rapport au Congrès de Paris, la toux diminue, la température vespérale baisse, la tendance aux hémoptysies disparaît et dans la plupart des cas, au bout de 6 à 8 semaines de traitement, on obtient un changement complet dans l'état du malade. Les crachats deviennent muqueux, ils se raréfient; et le nombre des Bacilles de Koch diminue graduellement. Les malades augmentent de poids, les forces se relèvent, et l'auscultation est vite modifiée dans un sens favorable.

Notons encore, et le docteur Corson, a justement insisté sur ce point, que l'Iodéol n'est nullement contre-indiqué, comme le sont les iodures, dans les états hémoptoïques, attendu que l'Iode Colloïdal n'a point d'action hyperémianté notable sur le poulmon. C'est ce qui fait que, chez les tuberculeux sujets aux hémoptysies, les crachements de sang, loin d'augmenter, s'arrêtent et cessent définitivement.

— :o: —

REVUE DES JOURNAUX

—

DOSAGE DES CHLORURES DANS LES NEPHRITES

—

La rétention chlorurée ne s'effectue pas suivant un type spécial pour chaque sujet. Au contraire elle obéit à une loi; elle s'effectue suivant un rythme constant, quelle que soit la perméabilité du rein aux chlorures, différent seulement selon les cas par ses modalités: c'est le "rythme en échelons".

La fonction chlorurée du rein peut s'apprécier avec précision par la méthode suivante: le sujet est soumis à un régime sans sel,