

Juillet.—Le sarclage doit être tout fini au commencement de ce mois, avant de commencer les chardons et les mauvaises herbes dans les prairies ou le long des clôtures, doivent être coupés, et ramassés dans la cour de la ferme dans un tas pour faire l'engrais. Vers le 15 de ce mois, le trefle est en fleur prêt pour la faux, et si c'est possible, on doit finir la colte de foin sur toutes les prairies élevées durant le mois. L'orge est souvent mûre à la fin de juillet, faut autant que possible la préserver de l'exposition à la pluie après qu'elle est coupée. Elle devrait être mise en meulon ou engrangée sitôt qu'elle est sèche. La mouche à blé qui se montre vers le 25 juin, continue généralement de 20 à 30 jours, et ensuite disparaît. Du premier au quinze juillet le ver de la mouche ne se découvre dans l'épi du blé, le blé qui n'épie pas avant le 15 juillet, est en général exempt des attaques de la mouche, mais si l'épi fait son apparition à cette époque, on est sûr que la récolte sera endommagée. S'il arrivait qu'il fit du vent durant les nuits précéderont le temps où le champ de blé épiera, la colte pourrait en être exempte, par la raison que la mouche ne saura où se reposer, le vent l'emportant. Malheureusement les soirées à cette saison de l'année sont très-calmes, et c'est là la cause, que la mouche fait plus de ravage en ce pays que dans les Iles d'Angleterre, où il vente beaucoup plus. Si on pouvait semer le blé de manière qu'il épiât vers le vingt juin, il ne souffrirait pas des ravages de la mouche. Le labourage d'été, et l'usage de la chaux et de la potasse, sont un préservatif puissant contre la vermine.

Aout.—Ce mois est le principal pour les récoltes et beaucoup dépendra pour l'avantage du cultivateur du beau temps qu'il y aura à cette époque. Tout le temps doit être apporté à mettre sa récolte en sûreté. Si c'est possible, le labourage d'été devrait être repassé et si on sème du blé d'automne, c'est avantageux de le mettre en terre avant la fin de ce mois sur la terre labourée en été. S'il est nécessaire d'y joindre du fumier, de la chaux ou tout autre engrais, il faut les labourer avec la semence, les couvrant légèrement avec

charrue. Si le blé est en herbe, il faut lui laisser ce temps-ci. Les champs couverts de chaume doivent être réservés des ravages.

Septembre.

Septembre. — On doit aussi pour le grain être arrangé en Août. Les grains ne seront mûrs, aussi le blé semé tardivement le labourage doit pour le blé d'automne du printemps, labourer ensemble.

vous le pouvez. Vers la fin de ce mois.

Octobre.

Octobre. — Dans les patates, et en 15 ou au plus tard de ce temps-ci, et qu'il y a des labours. Si les labours d'automne, il faut y faire de manière à les ramener au printemps. Les grains ne sont nourris à se semer avant qu'ils perdent les terres doit s'écrouler particulièrement sur les terres.

Novembre.

Novembre. — Continues durant ce mois, temps favorable pour le labourage de ce mois. Il doit être fini avant le labourage des carottes, les carottes doivent être semées jusqu'au premier décembre aussi de bonne heure viendrait dangereusement la récolte. Il est difficile de cultiver sans qu'elles soient à une température convenable les placer. Un...