

sinuée. Ailes moyennes, atteignant le tiers de la partie exposée de la queue; les 4 rémiges extérieures graduées, la lère égale aux secondaires. Queue longue, plus longue que les ailes, considérablement arrondie. Tête munie d'une huppe.

**Le Cardinal de Virginie.** *Cardinalis Virginianus*, Bonap. *Coccothraustes*, Briss. *Loxia cardinalis*, Linn. *Pitylus cardinalis*, Aud. *Grosbec de Virginie*, Buff.—Angl. *Red Bird*; *Cardinal*.—Longueur  $8\frac{1}{2}$  pouces; ailes  $3\frac{3}{4}$ ; queue  $4\frac{1}{2}$  pouces. D'un rouge vermillon brillant, plus foncé sur la queue, le croupion et le dos. La tête portant une huppe aplatie de la même couleur. Bec rouge. Une bande étroite autour de la base du bec, avec le menton et la partie supérieure de la gorge, noires.

La femelle d'un rouge un peu brun, le dos d'un olive léger, la tête avec une teinte de jaunâtre: le dessous jaune.

P. et RR. Ce magnifique oiseau quoique rare se rencontre cependant presque chaque année dans le voisinage de Québec. Voir pour son histoire le 1er vol. du NATURALISTE, page 225.

---

## PETITE FAUNE ENTOMOLOGIQUE

DU

CANADA.

---

Comme un des plus grands obstacles, en ce pays, à l'étude de l'histoire naturelle, est le manque d'ouvrages traitant spécialement des productions naturelles de cette partie du nouveau continent, nous voulons faire suivre les principes généraux de la science entomologique que nous avons donnés, d'une petite faune de nos insectes, afin que les amateurs puissent y trouver un moyen de reconnaître, par l'application, les principes que nous avons posés, en même temps qu'une méthode pour coordonner les collections qu'ils ne doivent pas manquer de commencer dès le début, s'ils veulent faire connaissance avec ce monde des