

Nous est avis que si l'exemple de ceux-ci était davantage suivi par le citadin qui est porté à se désintéresser trop tôt, avant comme après une opération de ces cas, nous entendrions moins souvent la remarque que tel spécialiste des petites comme des grandes sphères de notre vaste profession, manque le but plus souvent qu'à son tour, à cause du point de vue trop exclusif auquel il se place, faute d'une expérience plus générale. En d'autres termes, s'il y avait plus de tendance de part et d'autre à l'assistance mutuelle, clients et médecins ou chirurgiens y gagneraient.

—OOC—

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA TÉTANIE ESSENTIELLE CHEZ LE NOURRISSON.

Dr R. FORTIER, Prof. à l'Université Laval, Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Médecin en Chef de l'Hospice St-Vincent de Paul.

—

La tétanie est une affection dont la description date de plusieurs années. On l'appelait indifféremment tétanos intermittent ou contracture essentielle des extrémités.

Ses principaux caractères magistralement décrits par Corvisart et surtout par Trousseau, sont des accès de contracture douloureuse localisée aux extrémités des membres et s'accompagnant le plus souvent d'une hyperexcitabilité musculaire généralisée.

La tétanie n'est pas une affection spéciale à l'enfance; elle se rencontre aussi chez les femmes enceintes et les nourrices (Apert).

On l'observe chez le nourrisson entre les âges de 3 à 15 mois, et elle serait plus commune qu'on ne le croit, si, connaissant la fréquence de ses manifestations latentes on avait recours à l'électro-diagnostic, (Comby).

Cette affection est spéciale à l'enfant au biberon et ne s'observe