

La bronchophonie est le signe le plus précoce et, très souvent, le seul d'adénopathie ; cependant, il s'y joint parfois de la submatité ou de la matité vraie, ces modifications du son s'observant au même niveau que la bronchophonie. La matité de la zone ganglionnaire antérieure coïncide fréquemment avec l'existence d'un lacis veineux de la région thoracique supérieure. Quant au souffle bronchique perçu le long de la colonne vertébrale, ce n'est jamais un symptôme précoce.

L'adénopathie trachéo-bronchique retentit habituellement sur l'état général des malades, qui sont pâles, anémiques, amigris, et dont la nutrition est languissante. Ces phénomènes généraux sont surtout marqués chez les nourrissons, qui ne présentent, à l'infection tuberculeuse, qu'une résistance des plus insuffisantes.

P. A. GASTONGUAY

——(o)——

Analyse

TRAITEMENT DE LA FIEVRE TUBERCULEUSE

Etudiant ce sujet, dont l'importance pratique n'a pas besoin d'être signalée, M. le professeur Lemoine donne les indications suivantes, qu'il nous a paru intéressant de résumer ici.

La quinine a été préconisée contre cette fièvre, et Jaccoud s'est fait le défenseur de son emploi : il la donne à doses assez élevées, par cachets de 0 gr. 50 pris de demi-heure en demi-heure, juste avant que la fièvre monte et jusqu'au moment où