

MEMOIRES

DE L'ECTOPIE TESTICULAIRE DOUBLE, VARIETE INGUINALE, ET SON TRAITEMENT

(ORCHIDOPEXIE PAR TRANSPOSITION TESTICULAIRE
INTRA SCROTALE).

L'ectopie inguinale est avec la variété dite abdominale, la seule de toutes les variétés d'ectopie testiculaire qui soit du ressort de la chirurgie. Comme bien d'autres anomalies elle attend encore une explication pathogénique satisfaisante. Cependant, la fréquence chez les dégénérés de malformations nettement indépendantes des lésions de l'appareil nerveux central fait que la tendance actuelle est de la ranger dans le cadre d'ailleurs très vaste des dégénérescences, sans qu'on puisse pour le moment préciser à quelle portion du tractus génital s'applique initialement la dégénérescence.

Il ne faut pas croire que l'ectopie testiculaire soit une anomalie destinée à prendre rang parmi les curiosités pathologiques. Tout au contraire, elle mérite à plus d'un titre l'attention du praticien. Qu'elle soit méconnue ou dédaignée le plus fréquemment, cela n'est pas douteux, l'expérience de tous les jours est là pour le prouver.

Cela est pourtant bien surprenant quand on songe au pronostic de cette anomalie, pronostic sérieux pour la santé de celui qui en est porteur et fatal pour son avenir génital, lorsque l'ectopie est double.

Ordinairement on ne consulte pas parce que l'on est porteur