

Il y a scarlatine et scarlatine, comme il y a fagots et fagots.

Dans les formes cliniques ordinaires, voici la conduite que je suis, appuyé en cela par d'excellents pédiâtres: Je maintiens le régime lacté pendant la période aiguë de la maladie, qui dure d'ordinaire une semaine. La semaine suivante, je permets le régime lacto-végétarien; et dès la troisième semaine, j'autorise les oeufs et la viande,—quand l'âge le permet sans doute—et surtout la viande crue dont la digestion est plus facile que la viande cuite. Elle est aussi plus réconfortante.

Et je vous avoue sincèrement que je n'ai jamais eu à le regretter.

* * *

Que conclure ?

a)—Dans mon humble opinion, je crois en l'efficacité de ce traitement, un peu, très peu quant à ce qui regarde l'évolution de la maladie elle-même, mais j'y crois beaucoup au point de vue prophylactique.

Placer les scarlatineux dans une cage de mousseline, avec l'essence d'eucalyptus comme désinfectant, constitue une excellente protection pour l'entourage. Seulement l'essentiel pour réussir est d'appliquer ce traitement précocement. La méthode de Milne doit être mise en oeuvre dès le début de la maladie.

b)— L'isolement individuel constitue la méthode de choix dans la prophylaxie des maladies contagieuses. C'est ce qu'on peut réaliser dans notre hôpital civique. Mais la méthode de Milne, bien appliquée peut rendre de grands services dans bien des cas:

Dans les familles nombreuses, à logement petit.

Dans les pensionnats ou les orphélinats.

Dans les hôpitaux contagieux, en temps d'épidémie.

c)—Bien que ce traitement de Milne soit considéré comme particulier à la scarlatine, on est justifiable tout de même d'avoir recours à cette méthode dans les cas de rougeole, de grippe, de diphtérie, de méningite cérébro-spinale.

**INFECTIONS ET TOUTES
SEPTICEMIES**

(Académie des Sciences et Société
des Hôpitaux du 22 décembre
1911.)

...LABORATOIRE COUTURIEUX....
18, Avenue Hoche, Paris.

Traitement LANTOL
— PAR LE —

Rhodium B. Colloïdal
électrique

AMPOULES DE 3 C'M.