

Ind. : Goître exophthalmique, maladie de Basedow. — *Pos.* : Chez l'adulte, $\frac{1}{2}$ à 1 millig., par 24 h.

E

Eau de mer. — *Eaux minérales.* — *V. Art spéciaux.*

Enesol. — (V. Mercure).

Ergotine. — (selon Yvon). — Extrait fluide d'ergot de seigle : 1 cc. représentant 1 gr. d'ergot. — *P. T.* : vaso-contricteur, excitant des fibres musculaires lisses, hémostatique. — *Ind.* : Mètrorrhagies, hémoptysies. — *Contre-Ind.* : Ne doit pas être administrée pendant la grossesse ni pendant l'accouchement avant complète évacuation de l'utérus. — *Pos.* : 2 à 3 cc. en 2 à 3 inj. sous-cut. — *Douloureux.*

Ergotinine. — S. eau additionnée d'acide lactique. — *P. T.* : et *Ind.* : Les mêmes que l'ergotine. Effets plus prompts et plus sûrs. —

Pos. : 1 milligr. par 24 h. en 4 inj. sous-cut. — *Douloureux.*

Esérine. — *F. us.* : Sulfate ou salicylate. — S. eau. — *P. T.* : Modérateur des réflexes, antimiydriatique puissant. — *Ind.* : Chorée, tétanos, épilepsie. — *Pos.* : 1 à 5 milligr. par inj. sous-cut. et par 24 h.

Ether sulfurique. — *P. T.* : Antispasmodique et excitant. — *Ind.* : Syncopes, asystolie, apoplexie, urémie, collapsus. — *Pos.* : 1 à 4 cc. — *Très douloureux.* — *Assoc.* : Avec camphre (éther camphré) ; avec alcool à parties égales (liqueur d'Hoffmann).

Ethoxycréatine. — *Dérivé éthoxylé de la créatine.* — S. dans solution de salycilate de soude. — *Ind.* : (comme créatine).

Eucaïne B. — *P. T.* : Anesthésique local, moins actif que la cocaïne 4 fois moins toxique. — *Ind.* : Chirurgie dentaire. — *Pos.* : $\frac{1}{2}$ à 4 centigr., en 2 injections, dans la gencive avant l'avulsion.

Eucalyptol. — S. huile. — *P. T.* : Antiseptique, antispasmodique. — *Ind.* : Bronchites fétides, gangrène et tuberculose pulmonaires. — *Pos.* : 5 à 10 cc. de la solut. huileuse à 15%. — Iuj. sous-cut. — *Douloureux.*