

OSTREA

Français—Huître.

Anglais—Oyster.

De la classe des *Mollusques acéphales Lamellibranches*, de l'ordre des *Ostracés*, du genre *Ostrea*.

Il n'y a pas certainement un mollusque qui soit plus connu en Canada que l'huître, qui nous vient des provinces du Nouveau Brunswick, de l'Île du Prince-Edouard et quelquefois de la Nouvelle-Écosse.

Il n'y en avait pas en Canada avant que j'en eusse établi un banc artificiel dans le Bassin de Gaspé, il y a trois ans; et d'après les résultats des examens que j'en ai faits depuis deux ans, je puis assurer qu'il est en voie de bien réussir.

PECTEN MAGELLANICUS

Français—Pecten, Peigne, Pelerine ou Monteur.

Anglais—Scallop.

De la classe des *Mollusques acéphales*, de l'ordre des *Ostracés*, du genre *Pecten*.

Cette variété de *Pecten*, se rencontre assez souvent sur les côtes du golfe, tant au Nord qu'au Sud.

Elle paraît préférer les fonds rocheux à tout autre.

La coquille atteint quelquefois une largeur de 7 pouces; elle est d'une forme à peu près semi-circulaire, mince, et renferme un animal dont la chair est excellente à manger, et rappelle beaucoup le goût de l'huître.

On la trouve sur les rivages à la suite de vents violents du large.

On peut aussi la pêcher avec la drague.

PECTEN ISLANDICUS.

Français—Peigne d'Islande.

Anglais—Iceland Scallop.

Ce *Pecten* habite aussi nos côtes. La coquille est plus petite que celle du *Pecten Magellanicus*, et se distingue des autres variétés par les cannelures qui sont à sa surface extérieure, et qui lui donnent beaucoup la forme d'un peigne.

La largeur de la coquille est de 3 à 4 pouces.

MYTILUS ÆDULIS.

Français—Moule comestible ou commune.

Anglais—Mussel.

Mollusque acéphale, de la classe des *Lamellibranches* de l'ordre des *Mytilacés*, du genre *Mytilus*.

La moule comestible a la coquille triangulaire, bombée et noirâtre à l'extérieur, et d'un blanc bleuâtre à l'intérieur.