

No. 2.—Térébenthine, $\bar{3}$ ss
Sel d'Epsom (ou de la Rochelle), $\bar{3}$ j
Savonnage chaud, Oj

Pour un lavement.

(b) *Lavement nutritif*.—Le lavement nutritif ne doit pas être donné plus souvent que toutes les quatre heures, ou six fois en vingt-quatre heures. La quantité de liquide injectée ne doit pas dépasser six onces. La muqueuse rectale absorbant peu, le lavement nutritif doit être porté aussi haut que possible, avec un tube rectal de caoutchouc durci ayant $\frac{1}{4}$ de pouce de diamètre et dont huit pouces au moins pénètrent dans le rectum. Le tube est introduit bien huilé ; à son extrémité externe on fixe un entonnoir pour verser doucement l'aliment liquide sans laisser entrer d'air. On place près du siège une serviette autour du tube pour recevoir les gouttes de liquide qui peuvent s'échapper du rectum ainsi que le tube lui-même quand on le retire de l'anus. Après chaque injection, on lave le tube en y faisant passer de l'eau chaude, puis on le conserve dans une solution boriquée faible. Quand le lavement nutritif doit être renouvelé fréquemment, il est bon, avant chaque injection, si l'on veut éviter d'irriter l'intestin, de l'irriguer avec de l'eau chaude simplement bouillie. Après le lavement, le malade doit rester tranquille une vingtaine de minutes. Autant que possible, on emploie pour les lavements nutritifs des aliments concentrés. La dose du jus de bœuf pur est de 1 à 1½ once par vingt-quatre heures ; celle de l'essence de bœuf est de 6 onces répétés une fois dans la journée. Le lait doit toujours être peptonisé (20 grains de pepsine préparée par chopine de lait) ; on laisse le vaisseau quinze minutes dans l'eau à la température de 100° F. ; puis on tient le lait sur la glace jusqu'au moment de le réchauffer pour le donner en lavement. Le brandy et le whisky sont très irritants pour la muqueuse intestinale ; on ne les donne généralement qu'à chaque second lavement, et on les remplace dans chaque lavement alter-