

connaissance, afin d'éviter les erreurs de diagnostic si faciles et si fâcheuses. Et puis enfin, le diagnostic une fois établi, le traitement est simple, et la guérison prompte et assurée.

Voilà en deux mots les motifs de cette répétition.

*
* *

L'observation que j'ai à vous présenter est celle d'un enfant de près de 4 mois, né à terme, issu de parents sains, et dont les 5 petits frères et sœurs sont aussi en bonne santé. Il était nourri au biberon depuis sa naissance avec du lait pasteurisé. Fait important à noter, l'enfant recevait une quantité insuffisante de nourriture. A l'âge de près de 4 mois, (exactement 3 mois et 26 jours), la mère ne lui donnait que 8 onces de lait par jour. C'était moins que la moitié de la ration ordinaire. Aussi, loin de profiter, avait-il dépéri, le pauvre petit. Au lieu de peser de 13 à 14 livres, poids normal à son âge, il ne pesait plus que 7½ livres.

En examinant l'enfant je le trouvai très pâle. Le pouls et la respiration étaient à peine perceptibles. Il me parut dans un état de faiblesse telle que j'ai cru qu'il allait mourir dans la journée. La mère me raconta que la digestion de l'enfant se faisait mal : il vomissait souvent et ses selles étaient de mauvaise couleur. Elle me dit aussi que cet état cachectique de l'enfant s'était produit brusquement. En quelques heures, il était devenu faible, souffrant, et immobile.

En effet, les yeux fermés, les jambes à demi-fléchies, l'enfant ne bougeait pas du tout. Je ne savais que penser. Une fois l'enfant déshabillé, je constatai sur la peau du dos particulièrement, des taches de purpura en assez grande quantité. Ces petites hémorragies sous-cutanées levèrent un coin du voile qui me cachait la vérité ; je pensai à la maladie de Barlow ou scorbut infantile. Sous l'empire de cette idée, j'examinai attentivement les