

jection dans le rectum de seize onces de thé de bœuf fort pour vider l'intestin et ensuite dans le but de soutenir les forces du malade, une injection répétée toutes les deux heures composée des substances suivantes : brandy, un once, éther sulfurique une drachme sulphate de quinine griv, thé de bœuf fort six onces. M. O'Grady et M. Fegan, internes, restèrent debout toute la nuit et prirent le plus grand soin du patient.

Jun 23 9 h. A. M. — Il a passé une nuit très agitée, n'a pas dormi : pouls 88, faible et intermittent ; respiration 30 ; les muscles du cou un peu relâchés ; les muscles abdominaux et dorsaux peut-être plus tendus. Il ne peut pas avaler sa salive et chaque effort dans ce but cause une grande douleur dans la gorge et amène des spasmes sévères ; le corps devient arqué la tête et les talons seulement touchant au lit. J'ordonnai de continuer le traitement avec un intervalle de quatre heures entre chaque injection ; je fis faire une nouvelle infusion de tabac. Je le vis à 2 hs. P. M. Spasmes un peu moins forts et il peut écarter les dents de manière à permettre l'introduction d'un crayon entr'elles. Pouls 86 plus fort non intermittent. 4 h. Le rectum a rejeté le lavement ; à 6 heures le pouls s'est élevé à 108 et est devenu très faible. 9 h. J'ai ordonné de répéter l'injection en y ajoutant 20 gouttes de teinture d'opium.

24 juin 1 h. a. m. Comme il pouvait avaler en suçant une éponge j'ai ordonné une potion contenant une once de brandy, 20 gts de teinture d'opium dans un verre d'eau, il prit tout au moyen de l'éponge. Ce fut cependant avec beaucoup de difficulté qu'il put l'avalier, quelques gouttes faisant fausse route et causant des spasmes très alarmants. Il mit 40 minutes à tout prendre. Après la potion le pouls tomba à 92 et devint plus fort. 3 h. a. m. Il avala au moyen d'un cathéter No. 8 une demi-once de brandy dans un verre d'eau avec 10 gts de teinture d'opium. Il craint de dormir ; quand il s'assoupit il fait des sauts, il gémit et rugit d'une manière affreuse. Vers le matin, il tomba dans un sommeil bien-faisant et vers 7 heures il but avec aise une livre de thé de bœuf avec le cathéter. 9 h.

a. m. La tention du cou est beaucoup moindre qu'elle a jamais été depuis son admission, mais l'abdomen est peut-être plus tendu. Durant la journée, il but une pinte de thé de bœuf contenant 12 œufs et douze onces de whisky. Les feuilles de tabac furent souvent renouvelées. Il a dormi quatre heures pendant la nuit.

26. 9 h. a. m. — Le cou passablement flexible ; le dos et l'abdomen dans le même état qu'hier : sur le soir il est tombé dans le délire et il avait l'ouïe extrêmement sensible. 10 h. p. m. Pouls 102.

27. 9. h. a. m. Dans le délire. Il soupçonne tout le monde de vouloir l'empoisonner. Pendant le jour, il a pris 12 œufs dans une pinte de thé de bœuf sans le cathéter. Il a dormi par intervalles.

28. — Délire beaucoup augmenté. Il ne veut endurer personne pas même sa femme. J'ai prescrit la mixture suivante :

P.
Sulf. quinine XXIV grs.
Morphine. ij
Eau distill. huit onces.
Méléz. une cuillerée à thé toutes les trois heures.

A 10 h. p. m. — Je lui ai donné la potion suivante :

P.
Chloroform XX gts
Tr. opium. XXV gts.
Sirop. une drachme.
Eau distill. huit onces.
A prendre à la fois.

Il n'a pas dormi pendant la nuit et a été très agité.

29. 9. h. a. m. — Pouls, 108, faible : s'est endormi à 10 h. a. m., et a dormi profondément jusqu'à 5 h. p. m. Il fut de nouveau agité et prit à différents intervalles 50 gts de teinture d'opium, ce qui le calma et sur le matin il s'endormit. 30. Il s'est éveillé à 8 h. a. m. Je l'ai vu à 9 h. Pas de délire, il ne se souvient de rien. Le cou et le dos passablement relâchés, mais ressentant une douleur intense depuis le cartilage xiphôïde jusqu'à la colonne vertébrale, des crampes dans les cuisses. Je fis appliquer des feuilles de tabac sur le ventre et les cuisses sans avoir préalablement enlevé l'épiderme.

Continuer le thé de bœuf, etc.