

*Symptômes* : Les symptômes généraux de la colique sont faciles à reconnaître : le cheval se jette à terre, se roule, se lève, frappe le sol avec son pied de devant, relève la lèvre supérieure, se regarde les côtés, etc.

*Traitement* : Si le cheval est gonflé (ballonné) on a à traiter les coliques gazeuses. Dans ce cas, laisser l'animal se rouler pour prendre la position qui lui est favorable. *Ne pas forcer le cheval à se promener ou à se tenir debout.* Donner un lavement. On se sert pour ces lavements d'eau de savon tiède, dans laquelle on peut encore ajouter un peu d'huile ; si la constipation persiste, ajouter de la thérébentine en proportion de deux onces par seaux d'eau.

Donner du soda à pâte dans la proportion d'une cuillerée à soupe toutes les heures dans une chopine d'eau ; s'il y a possibilité de se procurer de l'ammoniaque diluée, une demi-once dans une chopine d'eau produira un effet des plus satisfaisants.

Si, avec les symptômes ordinaires de la colique, on ne remarque pas de gonflements, donner des stimulants, tels que whisky mélangé par moitié d'eau, à la dose de 4 cuillerées à soupe, ou encore une demi once de gingembre délayé dans une chopine d'eau sucrée.

Si l'on doute que la colique provienne de la présence de vers dans les intestins, donner 7 dragmes d'aloës,