

Lorsque la sudation est finie on provoque le sommeil, soit par des inhalations de chloroforme, soit par l'hydrate de chloral, suivant les indications du cas.

Traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés.

L'iodoforme a été longtemps essayé dans cette affection, par M. Luido Ferguson de Dublin, qui rejette aujourd'hui l'emploi de ce médicament pour les raisons suivantes :

Difficulté d'obtenir l'iodoforme très-pur et en poudre impalpable ; inflammation très intense de la conjonctive qu'il provoque ; enfin, son influence toxique.

L'auteur emploie maintenant l'acide borique très finement pulvérisé, dont l'action lui paraît plus certaine et plus profonde que les lavages avec la solution d'acide borique à 5 pour cent, et de plus, ce traitement lui semble échapper à tous les reproches que l'on peut faire à l'iodoforme. L'application de la poudre d'acide borique sur une conjonctive en suppuration fait complètement disparaître l'écoulement dans une période qui varie de deux à douze heures et dans les cas légers, une seule application suffit.

Emploi de la cocaïne dans le choléra infantile.

Le Dr Her (d'Ottœssa) est convaincu de l'efficacité du remède qu'il a employé sur des enfants qui présentaient déjà du refroidissement des membres, des yeux éteints avec cyanose du visage, avec fréquence croissante du pouls. C'est un cinquième de gr d'hydrochlorate de cocaïne qu'on donne toutes les heures ou deux heures, suivant les cas. Deux étés ont fourni l'occasion de vérifier la démonstration de cette pratique.

Lavement à employer contre les convulsions des enfants.

Le Dr Simon recommande l'emploi du lavement suivant qu'on aura soin de faire précéder de l'administration d'un grand lavement simple ou huileux, afin de vider l'intestin.

Musc.....	grs iv
Camphre.....	grs xv
Hydrate de chloral.....	grs x
Jaune d'œuf.....	n° 1
Eau distillée.....	$\frac{3}{5}$ v