

ponctué. Ecusson plat, peu ponctué, avec une grande tache blanche (tout noir dans un autre individu). Ailes sub-hyelines, légèrement fuligineuses, nervures et stigma, noir; aréole subtriangulaire, moyenne. Métathorax finement et uniformément ponctué, à carènes obli-térées, point d'aréole contrale distincte. Pattes toutes noires, tarsi antérieurs quelque peu jaunâtres. Abdomen cylindrique, peu courbé, d'un rouge brique brillant à partir du 2e segment, aciculé à son extrémité.

Deux spécimens ♀. L'absence de carènes sur le méta-thorax rend cette espèce très reconnaissable.

46. Ichneumon œqualis, (Ichneumon égal). *nov. sp.*

♂—Long. 68 pouce. Thorax noir, abdomen roux. Tête noire; la face au dessous des antennes, les orbites antérieurs, le chaperon, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, blanc. Antennes plus longues que la tête et le thorax réunis, lisses, noires. Thorax finement ponctué, le collier en dessus, les écailles alaires, une ligne suturale en avant, une autre au dessous, l'écusson, jaune; métathorax uniformément ponctué, les carènes polies, l'aréole centrale sub-circulaire, assez grande. Ailes fuligineuses, nervures brunes, stigma jaune. Pattes noires, les tranchants, les 4 cuisses antérieures en avant, les 4 jambes antérieures avec leurs tarsi entièrement, les 3 hanches antérieures, la moitié basilaire des jambes postérieures, avec leurs tarsi excepté à l'ex-trémité des articles, jaune. Abdomen opaque, ponctué, étroit, à côtés égaux, d'un roux uniforme à l'exception du 1er segment qui est noir avec 2 petites taches jaunes latérales à son bord postérieur et aciculé au sommet.

Six spécimens ♂. Voisin du *vinnulentus*, Cress. par sa coloration. Var. segments 2 et 3 jaunes, oranges à la base; 2 petites lignes jaunes sur le dos du mésothorax.

47. Ichneumon ambiguus, Cress. (Ichneumon douteux).

Ichneumon ambiguus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 161 ♂.

Neuf spécimens ♂. L'écusson est quelquefois tout jaune, d'autrefois avec une petite tache seulement, et dans 3 spécimens tout noir. Les 4 hanches antérieures sont tachées de blanc, quelquefois les intermédiaires seulement. Se distingue particulièrement du *devinctor* par l'aréole de son métathorax qui est en pointe en avant.

48 Ichneumon placidus, (Ichneumon placide) *nov. sp.*

♂—Long. 65 pouce. Tête et thorax, noir; abdomen roux. La