

Si la découverte de l'albumine dans l'urine peut nous fournir des renseignements précieux, il faut se rappeler qu'une tumeur cérébrale peut aussi se compliquer de maladie de Bright.

Quant à ce qui regarde les lésions du nerf optique dans les maladies de l'encéphale, nous terminons ce que nous avions à dire à ce sujet par des conclusions.

Ces conclusions sont tirées d'un mémoire important et très élaboré dû à M. Parineau et publié dernièrement dans les annales d'oculistique. Nous y joindrons les conclusions d'un autre mémoire de M. Panas.

Nous les reproduisons textuellement :

" Les différentes affections intracranienues ne produisent la névrite oedémateuse (staunungs papille) qu'autant qu'elles se compliquent d'hydrocéphalie."

" Dans la méningite aigue en particulier, on ne peut établir aucun rapport entre l'intensité de l'inflammation et le siège des exsudats, les lésions encéphaliques et l'altération de la papille, qui par contre s'accompagnent constamment d'épanchement ventriculaire."

" Dans les tumeurs cérébrales le siège et le volume des productions morbides n'ont qu'une importance secondaire. La névrite optique peut manquer avec des tumeurs volumineuses et s'observer avec des néoplasies très petites si elles se compliquent d'hydrocéphalie."

Pour produire la névrite optique, l'hydrocéphalie doit elle-même être assez abondante et trouver dans les parois du crâne une résistance suffisante pour modifier la tension intracranienne."

" Les différentes théories par lesquelles on a expliqué le retentissement de la pression crânienne sur la papille sont insuffisantes. Celle qui rapporte l'altération du nerf optique à la stase veineuse est à la fois contraire à l'observation clinique et aux résultats fournis par l'expérimentation. Il n'y a pas de relation immédiate bien évidente entre la pression intra crânienne et la circulation du fond de l'œil."

" La théorie de la névrite par migration, dans laquelle on admet le refoulement du liquide céphalo rachidien, ou des exsudats inflammatoires du crâne jusque dans la lame criblée et la papille, par l'espace sous vaginal ou le nerf lui-même, bien que plus conforme à l'observation, soulève encore des objections."

" On a attribué au liquide épanché dans l'espace sous vaginal une importance exagérée. La névrite optique se produirait tout aussi bien si cet espace n'existait pas. La pression intra crânienne paraît à elle seule être insuffisante pour retentir sur la papille."