

CLINIQUE MÉDICALE

PAR

M. le Professeur JACCOUD

Des contre-indications de la médication salicylée dans le rhumatisme aigu-

Vous avez pu observer depuis plusieurs jours dans le service un malade couché au lit n° 4 de la salle Jenner, et récemment entré à l'hôpital pour une attaque de rhumatisme polyarticulaire aigu. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il s'agissait d'une crise rhumatismale aiguë nettement caractérisée, mais je vous faisais remarquer, dès les premiers jours, que les manifestations articulaires y étaient relativement généralisées, ou à l'apyrexie absolue que présentait notre malade. Cette crise, la première qu'il ait eue, a débuté trois jours avant son admission et, semble-t-il, sans raison appréciable. Le lendemain, à son réveil, il a ressenti des douleurs dans les articulations tibio-tarsiennes et les genoux, puis assez rapidement la tuméfaction est apparue, entraînant l'immobilisation, et successivement les épaules et les poignets étaient intéressés. Ce n'était pas la première fois que ce malade voyait se manifester des douleurs au niveau des jointures : il éprouvait assez fréquemment, nous disait-il, de l'endolorissement musculaire, mais jamais jusqu'à présent il n'avait eu de véritables arthrites.

Du côté de ses ascendants, nous n'avons eu à noter rien d'intéressant ; ses père et mère, en particulier, ne sont en aucune façon rhumatisants. Lui-même, bien que d'apparence délicate, n'a contracté aucune des maladies graves de l'enfance. Il est pâle, mais d'une pâleur anémique et ne présente ni le facies, ni les attributs du tempérament lymphatique. Agé présentement de seize ans, il est en pleine période de croissance et son développement semble se faire dans des conditions assez régulières.